

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

**PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA  
MÉDICA 2014 – EDITAL N. 001/2013**

**CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS**

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás coloca à disposição os Critérios da Avaliação de Habilidades e Competências da prova prática de Acesso Direto e Pré-Requisito do Processo Seletivo para Residência Médica – 2014.

**CIRURGIA VASCULAR  
(Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular)**

**Questão 01**

---

Nível da articulação do tornozelo. É conhecida como amputação de Syme (desarticulação do tornozelo).

**(1,0 ponto)**

**Questão 02**

---

Para que a cicatrização possa ocorrer na desarticulação do tornozelo, assim como para qualquer outro nível de amputação, a irrigação arterial tem de ser suficiente (sem isquemia e com pulsos distais presentes). Na amputação de Syme este aspecto é relevante devido ao retalho plantar longo do calcanhar.

**(1,0 ponto)**

**Questão 03**

---

Congestão Venosa Pélvica.

**(1,0 ponto)**

**Questão 04**

---

A Congestão Venosa Pélvica habitualmente é causada pela Síndrome de Cockett ou May-Thurner (compressão da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita), por Trombose Venosa Profunda ilíaca - femoral ou pela Síndrome do Quebra Nozes (pinçamento da veia renal esquerda pela aorta e artéria mesentérica superior).

**(1,0 ponto)**

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

**Questão 05**

---

Linfocintilografia dos membros inferiores.

**(1,0 ponto)**

**Questão 06**

---

Linfedema dos membros inferiores. A linfocintilografia é um método de imagem de fácil realização e pouco invasivo, com baixo risco de complicações, podendo ser utilizada não só para a confirmação da suspeita clínica de linfedema, como também para o seguimento ou monitoração de resposta a medidas terapêuticas<sup>3,4</sup>. O método tem sensibilidade de 70 a 95% e especificidade de 90 a 100% para linfedema, sendo proposto por diversos autores como exame inicial para afastar ou confirmar lesão linfática<sup>5-12</sup>.

**(1,0 ponto)**

**Questão 07**

---

A arteriografia demonstra a presença de estenose significativa (em torno de 70 a 90%) no terço proximal da artéria femoral superficial esquerda, com dilatação pós – estenótica associada, e formação de circulação colateral.

**(1,0 ponto)**

**Questão 08**

---

A arteriografia exhibe dissecação da artéria carótida interna com padrão estenótico (“sinal do barbante”).

**(1,0 ponto)**

**Questão 09**

---

Teste de Allen.

**(1,0 ponto)**

**Questão 10**

---

O teste de Allen negativo significa permeabilidade normal das artérias radial e ulnar.

**(1,0 ponto)**