

MÉDICO AMBULATÓRIO GINECOLOGISTA/OBSTETRA

28/08/2016

**SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO FOR AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
 2. Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
 3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.
 4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA OU AZUL, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
 5. Esta prova tem a duração de **quatro horas**, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.
 6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas **duas horas** de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das **11 horas**, desde que permaneça na sala até esse horário.
 7. Quando apenas três candidatos permanecerem na sala para terminar a prova, estes deverão aguardar até que o último a entregue, e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual aporão suas respectivas assinaturas.
- 8. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.**

Leia o **Texto 1** para responder às questões de **01 a 05**.

Texto 1

1 Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se à luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia.

[...]

2 Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono; ouviam-se amplos bocejos, fortes como marrulhar das ondas; pigarreava-se grosso por toda a parte; começavam as xícaras a tilintar; o cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros; trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons-dias; reatavam-se conversas interrompidas à noite; a pequenada cá fora traquinava já, e lá de dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, grinar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do dia.

AZEVEDO, Aluísio. *O cortiço*. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2004. p. 55. (Fragmento).

— QUESTÃO 01 —

No primeiro parágrafo do texto, a cena narrada mostra que os moradores do cortiço tiveram um sono pesado depois de uma noite agitada. As ocorrências discursivas do texto que permitem essa inferência são, respectivamente:

- (A) “Eram cinco horas da manhã” e “suspiro de saudade”.
- (B) “uma assentada sete horas” e “Um acordar alegre e farto”.
- (C) “sentiam ainda na indolência” e “à luz loura e tenra da aurora”.
- (D) “horas de chumbo” e “notas da última guitarra da noite antecedente”.

— QUESTÃO 02 —

O acordar dos moradores é descrito de forma oposta ao acordar do cortiço. O trecho do texto que demonstra essa oposição, centrada nos moradores, é:

- (A) “a pequenada cá fora traquinava já”.
- (B) “pigarreava-se grosso por toda a parte”.
- (C) “das portas surgiam cabeças congestionadas de sono”.
- (D) “trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras”.

— QUESTÃO 03 —

Os principais recursos de sequencialidade textual empregados no fragmento são:

- (A) dialogal-injuntivo.
- (B) narrativo-descritivo.
- (C) discursivo-imperativo.
- (D) dissertativo-argumentativo.

— QUESTÃO 04 —

Os recursos que fazem progredir o tema do texto são as

- (A) retomadas de personagens.
- (B) expressões catafóricas.
- (C) enumerações de fatos e ideias.
- (D) correlações aspectuais.

— QUESTÃO 05 —

Expressões como “o cortiço acordava” e “começavam as xícaras a tilintar” conferem vida própria a seres inanimados. Trata-se de um recurso empregado no gênero literário, denominado de:

- (A) prosopopeia.
- (B) sinestesia.
- (C) onomatopeia.
- (D) alegoria.

— RASCUNHO —

Leia o **Texto 2** para responder às questões de **06 a 09**.

Texto 2

- 1 Com três voltas, destranco a fechadura de quatro faces. Destravo o pino superior de correntinha e o inferior de trameia metálica. Abro a porta e brado com os cães, para não me sujarem. Sigo pelo corredor com a pasta usual do trabalho, sem me atentar para o sol matutino. Paro no primeiro portão procurando a chave do outro, separada. Passo pelo segundo portão, este de ferro, caminhando até a garagem. Desligo o alarme sonoro do carro, depois destranco a porta. Abro o capô e reponho o cabo da bobina. Entro no carro para retirar as travas, primeiro a do câmbio depois a do volante. A chave da ignição por si mesma anula a trava do volante que vem de fábrica. Puxo o afogador e dou partida para esquentar o motor, enquanto desço para abrir o portão da garagem. Travas dupla na vertical, cadeado do meio e a corrente de meia polegada... pronto! Entro no carro, engreno a ré, saio devagar levantando os vidros e travando a porta. Deixo à minha esposa a tarefa de retrancar tudo.
- 2 No engarrafamento provocado pelo semáforo, vejo, pelo retrovisor externo, alguns garotos de rua se aproximarem. Checo as travas da porta, ok. Um deles olha para mim, através do vidro. Mostra-me um bilhetinho. Balanço a cabeça em sinal negativo. Segue. O tráfego não demora. Agora vem um homem, com alguma coisa na mão sob um jornal. Não. São dois homens. O carro à minha frente começa a se deslocar lentamente. Acelero o meu, fazendo escândalo. Sobe o RPM no painel. Saio tão lentamente quanto o carro da frente. Logo para de novo. Maldito trânsito. Não tem guardas. Meia hora depois avisto o prédio do escritório.
- 3 Na entrada da garagem do prédio o segurança confere minha credencial de estacionamento. "Pode seguir," me diz. Estaciono na minha vaga e fecho o carro, confiando no seguro do "Park way". Entro no elevador e me dou com o décimo terceiro andar. Toco a campainha eletrônica e a secretária pergunta quem é. "Sou eu", respondi. Um sibilo metálico destrava a porta de vidro e outro a madeira. Eu entro, falo um bom-dia mecânico, destranco minha sala, sento-me e respiro. "Ufa! Cheguei."
- 4 Deschaveio minhas gavetas. "Não acredito! Esqueci a senha do meu programa em casa."

CASTRO, Cláudio de. *O pão de cada dia*. Goiânia: Grupo Educart, 2012. p. 79-80.

— QUESTÃO 06 —

O tema central do Texto 2 é a

- (A) distração do personagem principal.
- (B) preocupação com a segurança.
- (C) observação do cenário local.
- (D) obsessão pelo trabalho.

— QUESTÃO 07 —

A progressão do Texto 2 é garantida pelo emprego reiterado de

- (A) verbos na primeira pessoa do singular.
- (B) operadores argumentativos.
- (C) marcadores discursivos.
- (D) elementos dêiticos.

— QUESTÃO 08 —

Ao longo do texto, a palavra "trava" adquire duplo sentido. Esses sentidos estão relacionados aos travamentos que indicam, ao mesmo tempo,

- (A) trancas de móveis e fechaduras de portas.
- (B) equipamentos de trabalhos e transeuntes nas ruas.
- (C) utensílios domésticos e aparelhamento de portarias.
- (D) segurança e dificuldade de deslocamento no trânsito.

— QUESTÃO 09 —

A palavra "deschaveio", no último parágrafo do texto, é um uso incomum para significar "abrir gaveta", embora apresente um processo produtivo de formação de palavras da língua portuguesa. Nesse caso, trata-se de

- (A) neologismo.
- (B) derivação imprópria.
- (C) aglutinação.
- (D) composição por justaposição.


— RASCUNHO —

— QUESTÃO 10 —

Releia o **Texto 2** e leia o **Texto 3** a seguir para responder à questão.

Texto 3

Engarrafamento



Disponível em:
<<http://blogs.diariodepernambuco.com.br/mobilidadeurbana/tag/engarrafamento/page/2/>>. Acesso em: 14 maio 2016.

O tema secundário do Texto 2 é a condição do trânsito nas grandes cidades. Nesse sentido, o recurso linguístico e a função considerados na composição do Texto 3 são, respectivamente:

- (A) eufemismo e paráfrase.
- (B) aliteração e sinonímia.
- (C) sinédoque e paródia.
- (D) metáfora e síntese.

— RASCUNHO —

— RASCUNHO —

— QUESTÃO 11 —

O Programa Nacional de Imunização organiza toda a política nacional de vacinação para a população brasileira. Esse programa tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. A gestão de suas ações é compartilhada pela União, estados, Distrito Federal e municípios, sendo responsabilidade da esfera federal

- (A) fornecer seringas e agulhas para aplicação das vacinas.
- (B) prover imunobiológicos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações.
- (C) descartar frascos, seringas e agulhas utilizados nas vacinações.
- (D) coletar e processar dados de vacinação provenientes das unidades notificadoras.

— QUESTÃO 12 —

De acordo com a Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Conselho de Saúde, de caráter permanente e deliberativo, é composto de representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, na seguinte proporção:

- (A) 25% – representantes do governo, 25% – prestadores de serviço, 25% – profissionais de saúde e 25% – usuários.
- (B) 15% – representantes do governo, 35% – prestadores de serviço e 50% – profissionais de saúde e usuários.
- (C) 80% – representantes do governo e prestadores de serviço e 20% – profissionais de saúde e usuários.
- (D) 50% – representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde e 50% – usuários.

— QUESTÃO 13 —

No artigo 198 da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde se conformam em uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, regido pelas seguintes diretrizes:

- (A) descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
- (B) universalização, equidade e controle social.
- (C) municipalização, autonomia e igualdade.
- (D) coordenação, racionalidade e intersetorialidade.

— QUESTÃO 14 —

Leia o caso clínico a seguir.

Na semana passada, a menina F., de nove anos, teve que sair mais cedo da escola porque ficou doente, apresentando vômitos, dor abdominal e dor de cabeça, logo depois de comer o lanche servido pela escola durante o recreio. Quando F. melhorou e voltou às aulas, ficou sabendo que muitos de seus coleguinhas também ficaram doentes com os mesmos sintomas.

Esse evento, ocorrido na escola de F., é considerado

- (A) uma pandemia.
- (B) um surto epidêmico.
- (C) uma epidemia lenta.
- (D) uma endemia.

— QUESTÃO 15 —

De acordo com a Portaria n. 104, de 25 de janeiro de 2011, a Lista de Notificação Compulsória contempla doenças, agravos e eventos de importância para a saúde pública de abrangência nacional em toda a rede de saúde pública e privada. Fazem parte dessa lista:

- (A) febre amarela, anemia falciforme e acidente por animais peçonhentos.
- (B) malária, hipertensão arterial e atendimento antirrábico.
- (C) dengue, rubéola e intoxicação exógena.
- (D) sarampo, diabetes e eventos adversos pós-vacinação.

— QUESTÃO 16 —

Os conceitos de transversalidade, indissociabilidade entre gestão e atenção, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos são princípios

- (A) do Pacto pela Vida.
- (B) da Política Nacional de Promoção da Saúde.
- (C) do Pacto em Defesa do SUS.
- (D) da Política Nacional de Humanização.

— QUESTÃO 17 —

A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, causada pelo *Treponema pallidum*. Essa doença é transmitida de mãe para filho, resultando na sífilis congênita. Como medida de prevenção e controle da sífilis durante a gravidez, deve-se:

- (A) tratar as parcerias sexuais de casos de sífilis primária, secundária ou latente precoce, mesmo que apresentem testes sorológicos não reagentes.
- (B) realizar uma testagem para sífilis no 1º trimestre da gravidez ou na 1ª consulta, e outra, no início do 2º trimestre.
- (C) tratar a gestante com penicilina de acordo com a fase clínica da doença e finalizar o tratamento em até 60 dias antes do parto.
- (D) vacinar a gestante contra hepatite C, de acordo com o calendário de vacinação do PNI do Ministério da Saúde.

— QUESTÃO 18 —

Leia o caso clínico a seguir.

A senhora R., mulher de 70 anos, estava sozinha em casa quando sentiu-se mal com uma intensa dor de cabeça de início súbito. Resolveu ir até o posto de saúde da família. Ao chegar lá, só conseguiu falar que estava com uma dor muito forte na cabeça e desmaiou logo em seguida. A equipe da Estratégia Saúde da Família a socorreu prontamente e verificou que seus sinais vitais estavam normais, porém a senhora R. continuava inconsciente. O SAMU foi chamado e rapidamente a levou até a UPA, onde foi monitorizada e submetida a exames clínicos e laboratoriais. Logo depois, a senhora R. foi transferida, novamente pelo SAMU, para a UTI de um hospital de referência.

De acordo com a Portaria n. 1.600, de 7 de julho de 2011, os pontos de atenção à saúde em que a senhora R. foi atendida são componentes da

- (A) rede de atenção às doenças crônicas.
- (B) política de atenção à saúde da mulher.
- (C) rede de atenção às urgências.
- (D) política de atenção à pessoa idosa.

— QUESTÃO 19 —

A Rede de Atenção Psicossocial oferece atendimento para pessoas com problemas mentais e decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. A Atenção Básica incorpora esta rede por meio de serviços e equipamentos como:

- (A) unidade de acolhimento e iniciativas de geração de trabalho e renda.
- (B) consultório na rua e núcleo de apoio à saúde da família.
- (C) serviço de atenção em regime residencial e programa de volta para casa.
- (D) serviços residenciais terapêuticos e centro de atenção psicossocial.

— QUESTÃO 20 —

As doenças causadas por agentes infecciosos e parasitários e consideradas endêmicas em populações de baixa renda são chamadas de doenças:

- (A) degenerativas.
- (B) emergentes.
- (C) reemergentes.
- (D) negligenciadas.

— QUESTÃO 21 —

No processo histórico e social da organização da saúde no Brasil, os temas saúde como direito, reformulação do sistema nacional de saúde e financiamento do setor saúde foram premissas da

- (A) 5ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1975.
- (B) 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986.
- (C) 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992.
- (D) 13ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2007.

— QUESTÃO 22 —

O modelo médico-assistencial privatista tem como objetos de seu trabalho:

- (A) doença e doentes.
- (B) condições de vida e trabalho.
- (C) modos de transmissão e fatores de risco.
- (D) determinantes e necessidades de saúde.

— QUESTÃO 23 —

Prevenção em saúde pública corresponde à implementação de ações antecipadas a fim de interromper ou anular a evolução de uma doença. A prevenção primária consiste em

- (A) diagnóstico precoce e reabilitação.
- (B) tratamento imediato e recuperação.
- (C) promoção da saúde e proteção específica.
- (D) limitação de incapacidade e fisioterapia.

— RASCUNHO —**— QUESTÃO 24 —**

De acordo com a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, um dos princípios organizativos do Sistema Único de Saúde é a

- (A) integralidade.
- (B) equidade.
- (C) coletividade.
- (D) resolubilidade.

— QUESTÃO 25 —

A prática de atividade física, a alimentação saudável e o combate ao tabagismo são medidas de prevenção e controle de doenças

- (A) crônicas.
- (B) exantemáticas.
- (C) transmissíveis.
- (D) cromossômicas.

— RASCUNHO —

— QUESTÃO 26 —

A restrição de crescimento intrauterino (RCIU) está associada com alta morbidade e mortalidade perinatal. Seu adequado diagnóstico tem, portanto, impacto no bem-estar fetal. Entre os métodos diagnósticos para detectar a RCIU, qual é o mais preciso?

- (A) Medida seriada da altura uterina.
- (B) Curva de ganho ponderal materno.
- (C) Doppler de artérias uterinas no primeiro trimestre.
- (D) Ultrassonografia obstétrica seriada.

— QUESTÃO 27 —

O organismo da mulher passa por adaptações fisiológicas durante a gravidez, sendo fundamental o conhecimento dessas modificações para melhor orientar as gestantes no pré-natal. Entre essas adaptações, deve-se considerar:

- (A) a redução fisiológica da abertura da sínfise púbica.
- (B) a passagem da postura da gestante para lordose lombar.
- (C) o centro de gravidade é alterado para a posição cífótica.
- (D) a marcha torna-se atáxica.

— QUESTÃO 28 —

Um dos exames obrigatórios na assistência pré-natal é a avaliação da altura uterina e a sua correlação com a idade gestacional. Então,

- (A) após a 20^a semana, a correlação deixa de existir.
- (B) na 8^a semana, o útero atinge a sínfise pública.
- (C) na 39^a semana, a altura uterina é de 39 cm.
- (D) em torno da 20^a semana, a altura uterina atinge a cicatriz umbilical.

— QUESTÃO 29 —

Do ponto de vista da assistência às gestantes com cardiopatia, deve-se levar em conta que

- (A) o parto assistido com fórceps está contraindicado.
- (B) o quadro clínico piora a partir da 20^a semana.
- (C) a condição clínica piora após o fim do período gravídico puerperal.
- (D) a prematuridade está associada, mas não há RCIU.

— QUESTÃO 30 —

Qual das situações a seguir, relacionadas à gemelaridade a termo em primigesta, é uma contraindicação absoluta ao parto vaginal?

- (A) Dicoriônica diamniótica com o primeiro feto céfálico e o segundo feto pélvico.
- (B) Monocoriônica diamniótica com os dois fetos céfálicos.
- (C) Monocoriônica monoamniótica com os dois fetos céfálicos.
- (D) Monocoriônica diamniótica com o primeiro feto céfálico e o segundo feto pélvico.

— QUESTÃO 31 —

Uma primigesta com hipotireoidismo, na oitava semana de gestação, deve receber a seguinte informação:

- (A) o valor do TSH deve ficar abaixo de 2,5 mUI/l.
- (B) o seguimento com T4 livre é mensal.
- (C) a dose da levotiroxina deve ser diminuída.
- (D) a administração de levotiroxina é realizada concomitante aos polivitamínicos.

— QUESTÃO 32 —

Leia o caso clínico a seguir.

Primigesta de 18 semanas retorna à consulta de pré-natal com resultado de imunofluorescência para toxoplasmose com o IgG de 1/1024 e IgM negativa.

Qual é a conduta mais adequada?

- (A) Tratar com espiramicina.
- (B) Repetir o exame em 15 dias.
- (C) Realizar cordocentese na 22^a semana.
- (D) Fazer seguimento pré-natal.

— QUESTÃO 33 —

Leia o caso clínico a seguir.

Secundigesta na 12^a semana refere na consulta de pré-natal que o seu primeiro filho está com diagnóstico de rubéola. É solicitado exame sorológico e são detectadas a presença de IgG e a ausência de IgM.

A conduta mais apropriada para este caso é:

- (A) afastar a gestante da criança de cinco a sete dias após o aparecimento do exantema.
- (B) indicar a interrupção da gravidez.
- (C) realizar teste de avidez para rubéola.
- (D) orientar sobre a imunização adquirida.

— QUESTÃO 34 —

A asma durante a gravidez é tratada com os mesmos preceitos terapêuticos a serem observados na paciente não grávida. No entanto, a seguinte medicação deve ser evitada na gestação:

- (A) Adrenalina.
- (B) Terbutalina.
- (C) Loratadina.
- (D) Budesonida.

— QUESTÃO 35 —

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 45 anos, submetida à histerectomia total por miomatose uterina há seis meses, retorna ao ambulatório para coleta de preventivo. Os dois últimos preventivos anteriores à cirurgia eram normais.

Neste caso, o rastreamento colpocitológico deve ser

- (A) realizado semestralmente.
- (B) realizado anualmente.
- (C) realizado a cada cinco anos.
- (D) dispensado.

— QUESTÃO 36 —

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente usuária do sistema intrauterino de levonorgestrel há cinco anos retorna à consulta de acompanhamento para trocar o aparelho por outro. No exame especular, o fio não está visível.

Qual é a conduta indicada após descartar a gravidez?

- (A) Curetagem uterina.
- (B) Histeroscopia.
- (C) Histerectomia.
- (D) Curagem uterina.

— QUESTÃO 37 —

Mulher de 24 anos queixa-se de dor ao manter relações sexuais, no momento da penetração. Qual é o diagnóstico menos provável, neste caso?

- (A) Endometriose.
- (B) Vulvovaginite.
- (C) Vaginismo.
- (D) Condiloma acuminado.

— QUESTÃO 38 —

Mulher de 50 anos, menopausada, apresenta exame ecográfico com resultado de tumoração em ovário esquerdo. Considerando tratar-se de tumor benigno, qual das características pode ser encontrada?

- (A) Multisseptação.
- (B) Presença de septo de 5 mm.
- (C) Conteúdo anecoide.
- (D) Presença de vegetações.

— QUESTÃO 39 —

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente com prole definida, de 44 anos, com episódios de sangramento prolongado, com coágulos. Na ecografia endovaginal, útero e ovários de tamanhos normais, endométrio de 20 mm.

Qual conduta deve ser adotada nessa situação?

- (A) Histeroscopia ou curetagem semiótica.
- (B) Histerectomia.
- (C) Prescrição de anticoncepcional injetável.
- (D) Repetição do exame em três meses.

— QUESTÃO 40 —

Leia o caso clínico a seguir.

Nulípara de 30 anos apresenta anatomo-patológico de colo uterino com a descrição de neoplasia escamosa invasora de 10 mm de extensão e 5 mm de profundidade e margem anterior comprometida.

Qual é a conduta indicada?

- (A) Radioquimioterapia.
- (B) Traquelectomia ou conização.
- (C) Cirurgia de Wertheim Meigs.
- (D) Ampliação da margem comprometida.

— QUESTÃO 41 —

O uso dos anticoncepcionais orais pode aumentar a incidência da seguinte afecção:

- (A) adenoma hepático.
- (B) câncer de ovário.
- (C) câncer de endométrio.
- (D) fibroadenoma.

— QUESTÃO 42 —

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 21 anos, sem menarca, apresenta, no exame físico, desenvolvimento mamário e ausência de adrenarca. Solicitada ecografia endovaginal que mostrou ausência de útero e vagina curta.

Qual dos seguintes testes deve ser solicitado?

- (A) Testosterona.
- (B) FSH.
- (C) Prolactina.
- (D) Estradiol.

— QUESTÃO 43 —

Que quadrante da mama é responsável por abrigar mais da metade dos cânceres de mama?

- (A) Superior interno.
- (B) Superior externo.
- (C) Inferior interno.
- (D) Inferior externo.

— QUESTÃO 44 —

Menina de seis anos é trazida ao ambulatório pela mãe devendo à queixa de corrimento vaginal há duas semanas, com odor fétido. Qual é a principal causa de leucorreia, nesta faixa etária?

- (A) Vaginose bacteriana.
- (B) Má higiene.
- (C) Trauma.
- (D) Corpo estranho.

— QUESTÃO 45 —

A terapia hormonal (TH) deve ser indicada na janela de oportunidade da transição menopausal. Entre as indicações listadas, a TH NÃO é mais utilizada como prevenção

- (A) de ondas de calor.
- (B) da doença de Alzheimer.
- (C) da osteoporose.
- (D) da atrofia urogenital.

— QUESTÃO 46 —

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 45 anos, com amenorreia de um ano e espessamento do endométrio de 15 mm, retorna portando biópsia do endométrio, que revelou hiperplasia endometrial com atipia nuclear.

Qual é o fator mais importante para determinar o risco de malignidade, neste caso?

- (A) Idade da paciente.
- (B) Tempo de amenorreia.
- (C) Atipia nuclear.
- (D) Espessura do endométrio.

— QUESTÃO 47 —

A conduta em pacientes com diagnóstico histológico de NIC II, com menos de 20 anos de idade, é:

- (A) excisão em alça da zona de transformação.
- (B) conização por cirurgia de alta frequência.
- (C) eletrocauterização da lesão.
- (D) seguimento citológico.

— QUESTÃO 48 —

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente submetida à histerectomia total abdominal, devendo a miomatose uterina, retorna após sete dias da cirurgia com queixa de perda de urina pela vagina. Ao exame, presença de fístula urogenital.

Qual é o melhor momento para indicar a correção desta situação?

- (A) Imediatamente (72 horas).
- (B) Entre 15 e 30 dias.
- (C) Entre dois e três meses.
- (D) Entre quatro e seis meses.

— QUESTÃO 49 —

Leia o caso clínico a seguir.

Nulípara de 40 anos, com ciclos menstruais regulares, refere que há três meses apresenta aumento do fluxo e dos dias de menstruação. Exame ginecológico normal. Exame laboratorial indica anemia leve. Ecografia transvaginal evidenciou eco endometrial com espessamento focal decorrente de imagem hipoecogênica arredondada de 20 cm, no centro da cavidade uterina.

Qual é o diagnóstico?

- (A) Adenomiose.
- (B) Sinéquia uterina.
- (C) Mioma submucoso.
- (D) Pólipo endometrial.

— QUESTÃO 50 —

Leia o caso clínico a seguir.

Adolescente de 17 anos procura atendimento ambulatorial com história de rompimento do preservativo na relação sexual, há um dia. Está no meio do ciclo menstrual. A paciente solicita orientações sobre a anticoncepção de emergência.

Acerca do método de anticoncepção de emergência, o médico deve orientar que

- (A) as pílulas combinadas, comparadas às pílulas de progestagênio, no método Yuzpe, são menos eficazes, mas causam menos náuseas e vômitos.
- (B) o uso dessa anticoncepção pode ser feito em qualquer momento do ciclo menstrual, pois o mecanismo de ação inclui inibição ou retardamento da ovulação e interferência no transporte ovular.
- (C) o uso do método Yuzpe deve ser evitado no meio do ciclo, pelo risco da presença de embrião.
- (D) a utilização da anticoncepção de emergência após 24 horas do coito é ineficaz.