

MÉDICO AMBULATÓRIO UROLOGISTA

28/08/2016

**SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO FOR AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
 2. Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
 3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.
 4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA OU AZUL, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
 5. Esta prova tem a duração de **quatro horas**, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.
 6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas **duas horas** de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das **11 horas**, desde que permaneça na sala até esse horário.
 7. Quando apenas três candidatos permanecerem na sala para terminar a prova, estes deverão aguardar até que o último a entregue, e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual aporão suas respectivas assinaturas.
- 8. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.**

Leia o **Texto 1** para responder às questões de **01 a 05**.

Texto 1

1 Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se à luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia.

[...]

2 Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono; ouviam-se amplos bocejos, fortes como marrulhar das ondas; pigarreava-se grosso por toda a parte; começavam as xícaras a tilintar; o cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros; trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons-dias; reatavam-se conversas interrompidas à noite; a pequenada cá fora traquinava já, e lá de dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, grinar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do dia.

AZEVEDO, Aluísio. *O cortiço*. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2004. p. 55. (Fragmento).

— QUESTÃO 01 —

No primeiro parágrafo do texto, a cena narrada mostra que os moradores do cortiço tiveram um sono pesado depois de uma noite agitada. As ocorrências discursivas do texto que permitem essa inferência são, respectivamente:

- (A) “Eram cinco horas da manhã” e “suspiro de saudade”.
- (B) “uma assentada sete horas” e “Um acordar alegre e farto”.
- (C) “sentiam ainda na indolência” e “à luz loura e tenra da aurora”.
- (D) “horas de chumbo” e “notas da última guitarra da noite antecedente”.

— QUESTÃO 02 —

O acordar dos moradores é descrito de forma oposta ao acordar do cortiço. O trecho do texto que demonstra essa oposição, centrada nos moradores, é:

- (A) “a pequenada cá fora traquinava já”.
- (B) “pigarreava-se grosso por toda a parte”.
- (C) “das portas surgiam cabeças congestionadas de sono”.
- (D) “trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras”.

— QUESTÃO 03 —

Os principais recursos de sequencialidade textual empregados no fragmento são:

- (A) dialogal-injuntivo.
- (B) narrativo-descritivo.
- (C) discursivo-imperativo.
- (D) dissertativo-argumentativo.

— QUESTÃO 04 —

Os recursos que fazem progredir o tema do texto são as

- (A) retomadas de personagens.
- (B) expressões catafóricas.
- (C) enumerações de fatos e ideias.
- (D) correlações aspectuais.

— QUESTÃO 05 —

Expressões como “o cortiço acordava” e “começavam as xícaras a tilintar” conferem vida própria a seres inanimados. Trata-se de um recurso empregado no gênero literário, denominado de:

- (A) prosopopeia.
- (B) sinestesia.
- (C) onomatopeia.
- (D) alegoria.

— RASCUNHO —

Leia o **Texto 2** para responder às questões de **06 a 09**.

Texto 2

- 1 Com três voltas, destranco a fechadura de quatro faces. Destravo o pino superior de correntinha e o inferior de trameia metálica. Abro a porta e brado com os cães, para não me sujarem. Sigo pelo corredor com a pasta usual do trabalho, sem me atentar para o sol matutino. Paro no primeiro portão procurando a chave do outro, separada. Passo pelo segundo portão, este de ferro, caminhando até a garagem. Desligo o alarme sonoro do carro, depois destranco a porta. Abro o capô e reponho o cabo da bobina. Entro no carro para retirar as travas, primeiro a do câmbio depois a do volante. A chave da ignição por si mesma anula a trava do volante que vem de fábrica. Puxo o afogador e dou partida para esquentar o motor, enquanto desço para abrir o portão da garagem. Travas dupla na vertical, cadeado do meio e a corrente de meia polegada... pronto! Entro no carro, engreno a ré, saio devagar levantando os vidros e travando a porta. Deixo à minha esposa a tarefa de retrancar tudo.
- 2 No engarrafamento provocado pelo semáforo, vejo, pelo retrovisor externo, alguns garotos de rua se aproximarem. Checo as travas da porta, ok. Um deles olha para mim, através do vidro. Mostra-me um bilhetinho. Balanço a cabeça em sinal negativo. Segue. O tráfego não demora. Agora vem um homem, com alguma coisa na mão sob um jornal. Não. São dois homens. O carro à minha frente começa a se deslocar lentamente. Acelero o meu, fazendo escândalo. Sobe o RPM no painel. Saio tão lentamente quanto o carro da frente. Logo para de novo. Maldito trânsito. Não tem guardas. Meia hora depois avisto o prédio do escritório.
- 3 Na entrada da garagem do prédio o segurança confere minha credencial de estacionamento. "Pode seguir," me diz. Estaciono na minha vaga e fecho o carro, confiando no seguro do "Park way". Entro no elevador e me dou com o décimo terceiro andar. Toco a campainha eletrônica e a secretária pergunta quem é. "Sou eu", respondo. Um sibilo metálico destrava a porta de vidro e outro a madeira. Eu entro, falo um bom-dia mecânico, destranco minha sala, sento-me e respiro. "Ufa! Cheguei."
- 4 Deschaveio minhas gavetas. "Não acredito! Esqueci a senha do meu programa em casa."

CASTRO, Cláudio de. *O pão de cada dia*. Goiânia: Grupo Educart, 2012. p. 79-80.

— QUESTÃO 07 —

A progressão do Texto 2 é garantida pelo emprego reiterado de

- (A) verbos na primeira pessoa do singular.
- (B) operadores argumentativos.
- (C) marcadores discursivos.
- (D) elementos dêiticos.

— QUESTÃO 08 —

Ao longo do texto, a palavra "trava" adquire duplo sentido. Esses sentidos estão relacionados aos travamentos que indicam, ao mesmo tempo,

- (A) trancas de móveis e fechaduras de portas.
- (B) equipamentos de trabalhos e transeuntes nas ruas.
- (C) utensílios domésticos e aparelhamento de portarias.
- (D) segurança e dificuldade de deslocamento no trânsito.

— QUESTÃO 09 —

A palavra "deschaveio", no último parágrafo do texto, é um uso incomum para significar "abrir gaveta", embora apresente um processo produtivo de formação de palavras da língua portuguesa. Nesse caso, trata-se de

- (A) neologismo.
- (B) derivação imprópria.
- (C) aglutinação.
- (D) composição por justaposição.

— RASCUNHO —

— QUESTÃO 06 —

O tema central do Texto 2 é a


- (A) distração do personagem principal.
- (B) preocupação com a segurança.
- (C) observação do cenário local.
- (D) obsessão pelo trabalho.

— QUESTÃO 10 —

Releia o **Texto 2** e leia o **Texto 3** a seguir para responder à questão.

Texto 3

Engarrafamento



Disponível em:
<<http://blogs.diariodepernambuco.com.br/mobilidadeurbana/tag/engarrafamento/2/>>. Acesso em: 14 maio 2016.

O tema secundário do Texto 2 é a condição do trânsito nas grandes cidades. Nesse sentido, o recurso linguístico e a função considerados na composição do Texto 3 são, respectivamente:

- (A) eufemismo e paráfrase.
- (B) aliteração e sinonímia.
- (C) sinédoque e paródia.
- (D) metáfora e síntese.

— RASCUNHO —

— RASCUNHO —

— QUESTÃO 11 —

O Programa Nacional de Imunização organiza toda a política nacional de vacinação para a população brasileira. Esse programa tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. A gestão de suas ações é compartilhada pela União, estados, Distrito Federal e municípios, sendo responsabilidade da esfera federal

- (A) fornecer seringas e agulhas para aplicação das vacinas.
- (B) prover imunobiológicos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações.
- (C) descartar frascos, seringas e agulhas utilizados nas vacinações.
- (D) coletar e processar dados de vacinação provenientes das unidades notificadoras.

— QUESTÃO 12 —

De acordo com a Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Conselho de Saúde, de caráter permanente e deliberativo, é composto de representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, na seguinte proporção:

- (A) 25% – representantes do governo, 25% – prestadores de serviço, 25% – profissionais de saúde e 25% – usuários.
- (B) 15% – representantes do governo, 35% – prestadores de serviço e 50% – profissionais de saúde e usuários.
- (C) 80% – representantes do governo e prestadores de serviço e 20% – profissionais de saúde e usuários.
- (D) 50% – representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde e 50% – usuários.

— QUESTÃO 13 —

No artigo 198 da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde se conformam em uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, regido pelas seguintes diretrizes:

- (A) descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
- (B) universalização, equidade e controle social.
- (C) municipalização, autonomia e igualdade.
- (D) coordenação, racionalidade e intersetorialidade.

— QUESTÃO 14 —

Leia o caso clínico a seguir.

Na semana passada, a menina F., de nove anos, teve que sair mais cedo da escola porque ficou doente, apresentando vômitos, dor abdominal e dor de cabeça, logo depois de comer o lanche servido pela escola durante o recreio. Quando F. melhorou e voltou às aulas, ficou sabendo que muitos de seus coleguinhas também ficaram doentes com os mesmos sintomas.

Esse evento, ocorrido na escola de F., é considerado

- (A) uma pandemia.
- (B) um surto epidêmico.
- (C) uma epidemia lenta.
- (D) uma endemia.

— QUESTÃO 15 —

De acordo com a Portaria n. 104, de 25 de janeiro de 2011, a Lista de Notificação Compulsória contempla doenças, agravos e eventos de importância para a saúde pública de abrangência nacional em toda a rede de saúde pública e privada. Fazem parte dessa lista:

- (A) febre amarela, anemia falciforme e acidente por animais peçonhentos.
- (B) malária, hipertensão arterial e atendimento antirrábico.
- (C) dengue, rubéola e intoxicação exógena.
- (D) sarampo, diabetes e eventos adversos pós-vacinação.

— QUESTÃO 16 —

Os conceitos de transversalidade, indissociabilidade entre gestão e atenção, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos são princípios

- (A) do Pacto pela Vida.
- (B) da Política Nacional de Promoção da Saúde.
- (C) do Pacto em Defesa do SUS.
- (D) da Política Nacional de Humanização.

— QUESTÃO 17 —

A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, causada pelo *Treponema pallidum*. Essa doença é transmitida de mãe para filho, resultando na sífilis congênita. Como medida de prevenção e controle da sífilis durante a gravidez, deve-se:

- (A) tratar as parcerias sexuais de casos de sífilis primária, secundária ou latente precoce, mesmo que apresentem testes sorológicos não reagentes.
- (B) realizar uma testagem para sífilis no 1º trimestre da gravidez ou na 1ª consulta, e outra, no início do 2º trimestre.
- (C) tratar a gestante com penicilina de acordo com a fase clínica da doença e finalizar o tratamento em até 60 dias antes do parto.
- (D) vacinar a gestante contra hepatite C, de acordo com o calendário de vacinação do PNI do Ministério da Saúde.

— QUESTÃO 18 —

Leia o caso clínico a seguir.

A senhora R., mulher de 70 anos, estava sozinha em casa quando sentiu-se mal com uma intensa dor de cabeça de inicio súbito. Resolveu ir até o posto de saúde da família. Ao chegar lá, só conseguiu falar que estava com uma dor muito forte na cabeça e desmaiou logo em seguida. A equipe da Estratégia Saúde da Família a socorreu prontamente e verificou que seus sinais vitais estavam normais, porém a senhora R. continuava inconsciente. O SAMU foi chamado e rapidamente a levou até a UPA, onde foi monitorizada e submetida a exames clínicos e laboratoriais. Logo depois, a senhora R. foi transferida, novamente pelo SAMU, para a UTI de um hospital de referência.

De acordo com a Portaria n. 1.600, de 7 de julho de 2011, os pontos de atenção à saúde em que a senhora R. foi atendida são componentes da

- (A) rede de atenção às doenças crônicas.
- (B) política de atenção à saúde da mulher.
- (C) rede de atenção às urgências.
- (D) política de atenção à pessoa idosa.

— QUESTÃO 19 —

A Rede de Atenção Psicossocial oferece atendimento para pessoas com problemas mentais e decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. A Atenção Básica incorpora esta rede por meio de serviços e equipamentos como:

- (A) unidade de acolhimento e iniciativas de geração de trabalho e renda.
- (B) consultório na rua e núcleo de apoio à saúde da família.
- (C) serviço de atenção em regime residencial e programa de volta para casa.
- (D) serviços residenciais terapêuticos e centro de atenção psicossocial.

— QUESTÃO 20 —

As doenças causadas por agentes infecciosos e parasitários e consideradas endêmicas em populações de baixa renda são chamadas de doenças:

- (A) degenerativas.
- (B) emergentes.
- (C) reemergentes.
- (D) negligenciadas.

— QUESTÃO 21 —

No processo histórico e social da organização da saúde no Brasil, os temas saúde como direito, reformulação do sistema nacional de saúde e financiamento do setor saúde foram premissas da

- (A) 5ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1975.
- (B) 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986.
- (C) 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992.
- (D) 13ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2007.

— QUESTÃO 22 —

O modelo médico-assistencial privatista tem como objetos de seu trabalho:

- (A) doença e doentes.
- (B) condições de vida e trabalho.
- (C) modos de transmissão e fatores de risco.
- (D) determinantes e necessidades de saúde.

— QUESTÃO 23 —

Prevenção em saúde pública corresponde à implementação de ações antecipadas a fim de interromper ou anular a evolução de uma doença. A prevenção primária consiste em

- (A) diagnóstico precoce e reabilitação.
- (B) tratamento imediato e recuperação.
- (C) promoção da saúde e proteção específica.
- (D) limitação de incapacidade e fisioterapia.

— RASCUNHO —**— QUESTÃO 24 —**

De acordo com a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, um dos princípios organizativos do Sistema Único de Saúde é a

- (A) integralidade.
- (B) equidade.
- (C) coletividade.
- (D) resolubilidade.

— QUESTÃO 25 —

A prática de atividade física, a alimentação saudável e o combate ao tabagismo são medidas de prevenção e controle de doenças

- (A) crônicas.
- (B) exantemáticas.
- (C) transmissíveis.
- (D) cromossômicas.

— RASCUNHO —

— QUESTÃO 26 —

Que subtipo de receptores alfa 1-adrenérgico está ligado à concentração do músculo liso, na próstata?

- (A) a1a
- (B) a1b
- (C) a1c
- (D) a1d

— QUESTÃO 27 —

A complicação mais comum no pós-operatório imediato da ressecção transuretral da próstata é:

- (A) infecção do trato urinário.
- (B) retenção por coágulos.
- (C) síndrome da ressecção transuretral.
- (D) hemorragia, requerendo transfusão.

— QUESTÃO 28 —

Transplante preemptivo é:

- (A) o transplante realizado antes que o paciente entre em tratamento dialítico.
- (B) o transplante realizado nas primeiras vinte e quatro horas depois da captação do rim de doador falecido.
- (C) o transplante realizado com doador vivo não aparentado.
- (D) o transplante renal cujo rim foi obtido de doador falecido, por critérios expandidos.

— QUESTÃO 29 —

O câncer mais comum após o transplante renal é o de:

- (A) pulmão.
- (B) pele.
- (C) cérvix uterino.
- (D) rim.

— QUESTÃO 30 —

O tratamento do refluxo vesicoureteral pode ser realizado de diversas maneiras. Qual é a técnica cirúrgica que está restrita à via extravesical?

- (A) Cohen.
- (B) Politano Lead-better.
- (C) Lich-Gregoir.
- (D) Glenn Anderson.

— QUESTÃO 31 —

Qual das seguintes características tumorais NÃO é indicativa para BCG adjuvante pós-ressecção transuretral de bexiga para tumor de células transicionais?

- (A) Presença de CA *in situ*.
- (B) Multicentricidade.
- (C) Tumor menor 1 cm.
- (D) Alto grau.

— QUESTÃO 32 —

Qual é a localização inicial mais frequente do câncer de pênis?

- (A) Glande.
- (B) Base.
- (C) Frênuco.
- (D) Sulco coronal.

— QUESTÃO 33 —

O tratamento da bacteriúria assintomática é indicado a pacientes na seguinte condição:

- (A) idoso.
- (B) cateterizado.
- (C) gestante.
- (D) incontinente.

— QUESTÃO 34 —

Qual é o exame de maior acurácia para demonstrar a presença e extensão de trombo tumoral em veia cava inferior?

- (A) Ultrassonografia abdominal.
- (B) Venocavografia contrastada.
- (C) Tomografia computadorizada.
- (D) Ressonância nuclear magnética.

— QUESTÃO 35 —

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 63 anos, hipertenso controlado, sem queixas miccionais. Toque retal: próstata de tamanho normal, com nódulo pequeno em lobo direito. PSA: 7,8. Biópsia de próstata: adenocarcinoma de próstata Gleason 6, em 4 de 12 fragmentos.

Qual é o tratamento mais eficaz?

- (A) Orquiectomia subcapsular.
- (B) Hormonioterapia + radioterapia.
- (C) Ressecção endoscópica da próstata.
- (D) Prostatectomia radical.

— QUESTÃO 36 —

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente com história de infecção urinária recorrente apresenta, na uretrocistografia retrógrada, dilatação leve do ureter, da pelve renal e de cálices.

Em relação ao Sistema Internacional de Classificação do Refluxo Vesicoureteral, tal achado corresponde ao grau:

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) IV

— QUESTÃO 37 —

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 35 anos, afebril, com dor lombar à direita irradiada para a região escrotal, há dez dias. Ultrassom de vias urinárias mostra imagem hiperecoica com sombra acústica posterior de 7 mm, em ureter distal direito, compatível com cálculo, e hidronefrose leve à montante. Sem sucesso com terapia expulsiva medicamentosa.

Qual é o tratamento de maior eficácia?

- (A) Litotripsia extracorpórea por ondas de choque.
- (B) Ureterolitotomia videolaparoscópica.
- (C) Ureterolitotomia aberta.
- (D) Ureterorrenolitotripsia rígida.

— QUESTÃO 38 —

Leia o caso clínico a seguir.

Homem melanodérmico de 62 anos chega para rotina de saúde do homem, apresentando um PSA de 5,8 ng/ml e urina 1 e urocultura normais. Refere estar assintomático e, ao exame digital retal, não são encontradas anormalidades. Ao ultrassom, apresenta próstata de 28 gramas e ausência de resíduo pós-miccional. Na revisão de prontuário, os exames de PSA nos dois últimos anos consecutivos foram: 2,9 e 3,5.

Qual é a conduta indicada neste caso?

- (A) Aguardar seis meses e repetir os exames.
- (B) Fazer um tratamento por três meses com quinolonas, pois se trata de um quadro de prostatite aguda.
- (C) Considerar a normalidade constatada no exame digital como definitiva.
- (D) Encaminhar o paciente ao serviço de urologia para realizar biópsia prostática.

— QUESTÃO 39 —

Qual é o principal mediador do relaxamento da musculatura lisa cavernosa que leva à ereção?

- (A) Acetilcolina.
- (B) Noradrenalina.
- (C) Óxido nítrico.
- (D) Serotonina.

— QUESTÃO 40 —

O achado urodinâmico mais comum nas lesões medulares completas em nível sacral é:

- (A) arreflexia destrusora.
- (B) hiper-reflexia destrusora.
- (C) diminuição da complacência destrusora.
- (D) hiper-reflexia destrusora com dissinergia vesico-esfincteriana.

— QUESTÃO 41 —

O principal distúrbio hidroeletrólítico decorrente do uso do íleo como reservatório urinário é a:

- (A) alcalose metabólica hiponatrêmica.
- (B) acidose metabólica hipercalcêmica.
- (C) acidose metabólica hiperclorêmica.
- (D) alcalose metabólica hipoclorêmica.

— QUESTÃO 42 —

A cistite hemorrágica em um paciente imunossuprimido tem como causa mais frequente:

- (A) citomegalovírus.
- (B) coxsívirus.
- (C) herpes simples vírus tipo 2.
- (D) varicela-zóster vírus.

— QUESTÃO 43 —

Qual é a origem embriológica das vesículas seminais?

- (A) Ducto mesonéfrico distal.
- (B) Células da crista neural.
- (C) Tumefação do ducto paramesonéfrico distal.
- (D) Ducto mulleriano.

— QUESTÃO 44 —

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente de 27 anos apresenta cálculo de 2,0 cm na pelve renal direita, sem obstrução. Os exames laboratoriais e de imagem são sugestivos de cálculo de ácido úrico.

Nesse caso, o tratamento inicial de maior eficácia é:

- (A) ureterolitotripsia flexível a laser.
- (B) LECO (lítotripsia extracorpórea).
- (C) cirurgia aberta.
- (D) cirurgia percutânea.

— QUESTÃO 45 —

O cálculo urinário que NÃO é visto na tomografia computadorizada é aquele composto de

- (A) fosfato de cálcio.
- (B) fosfato amônio magnesiano.
- (C) ácido úrico.
- (D) indinavir.

— QUESTÃO 46 —

A etiologia mais frequente de hipercalciúria reabsortiva é:

- (A) síndromes diarreicas.
- (B) doença de Cushing.
- (C) hiperparatireoidismo.
- (D) acidose tubular renal.

— QUESTÃO 47 —

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 60 anos relata dor no flanco direito e calafrios. Ao exame, foram observados: PA: 80x40 mm de Hg, pulso: 128 bpm, temperatura de 40 °C e dor intensa no flanco direito. Na ecografia abdominal, observaram-se níveis de líquido e “debris” no bacinete direito que se encontrava dilatado.

Após uma antibioticoterapia venosa de amplo espectro e cuidados de suporte clínico, qual deve ser a conduta terapêutica?

- (A) Nefrostomia percutânea.
- (B) Pieloplastia direita.
- (C) Nefrectomia imediata.
- (D) Conduta expectante.

— QUESTÃO 48 —

O priapismo de baixo fluxo está primariamente associado

- (A) à doença de Parkinson.
- (B) à anemia falciforme.
- (C) ao trauma perineal.
- (D) ao linfoma.

— QUESTÃO 49 —

Dentre os subtipos histológicos de neoplasias germinativas malignas do testículo, seminomas e não seminomas, qual é o mais agressivo?

- (A) Tumor do saco vitelínico.
- (B) Teratoma.
- (C) Seminoma espermatocítico.
- (D) Carcinoma embrionário.

— QUESTÃO 50 —

O calibre das sondas uretrais é medido em *french*. Um *french* equivale a:

- (A) 0,25 mm
- (B) 0,33 mm
- (C) 0,40 mm
- (D) 0,50 mm