

PROVA PRÁTICA – OSCE/2017

ACESSO DIRETO

ESTAÇÃO E

ETIQUETA

CHECKLIST

Itens de Avaliação	Não Realizou Corretamente (0,0)	Realizou Parcialmente (0,5)	Realizou Corretamente (1,0)
01 Descreveu e demonstrou os sinais radiológicos de abdome agudo: 1) níveis hidroaéreos; 2) apagamento da sombra do psoas; 3) apagamento da gordura pré-peritoneal/velamento abdominal/“empilhamento de moedas”; 4) pneumoperitônio. Sim (os 4) = 1,0 Sim (apenas 3) = 0,5 Menos que 3 OU não descreveu/demonstrou= 0,0			
02 Descreveu e demonstrou como se pesquisa o sinal de Blumberg (palpação da FID com descompressão brusca dolorosa na FID) Sim (descreveu e demonstrou) = 1,0 Não = 0,0		X	
03 Descreveu e demonstrou como se pesquisa o sinal de Rovsing (dor na FID ao se comprimir a FIE) Sim (descreveu e demonstrou) = 1,0 Não = 0,0		X	
04 Descreveu e demonstrou como se pesquisa o sinal de Lenander (diferença de T axilar e retal >1 °C) Sim (descreveu e demonstrou) = 1,0 Não = 0,0		X	
05 Descreveu e demonstrou como se pesquisa o sinal de Lapinsky (dor à compressão da FID enquanto o paciente eleva o MI estendido) Sim (descreveu e demonstrou) = 1,0 Não = 0,0		X	
06 Incisão de MacBurney: local e trajeto (incisão no quadrante inferior direito, arqueada ou oblíqua, em uma linha imaginária entre a cicatriz umbilical e a espinha íliaca ântero-superior, passando por um ponto na junção do terço médio com o terço distal) Sim = 1,0 Não = 0,0		X	

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

07	Incisão de Baby-Cock-Davis: local e trajeto (incisão transversa no quadrante inferior direito, em uma linha imaginária entre a cicatriz umbilical e a espinha ilíaca ântero-superior, passando por um ponto na junção do terço médio com o terço distal) Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
08	Citou as fases da apendicite aguda/ou equivalentes: 1) catarral. 2) supurativa; 3) gangrenosa; 4) hiperplásica. Sim (3 a 4) = 1,0 Sim (apenas 2) = 0,5 1 OU não citou= 0,0			
09	Indicou o tratamento antibiótico adequado: 1) ceftriaxona e metronidazol; 2) clindamicina e metronidazol; 3) Unasyn. Sim (2 a 3) = 1,0 Sim (apenas 1) = 0,5 Não = 0,0			
10	Citou os diagnósticos diferenciais na peça cirúrgica: 1) adenocarcinoma; 2) linfoma; 3) carcinoide (ou tumor neuroendócrino - TNE); 4) apêndice normal. Sim (3 a 4) = 1,0 Sim (apenas 2) = 0,5 1 OU não citou= 0,0			

Data: ____/____/____.

Nome do Avaliador: _____

Assinatura do Avaliador: _____