

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – UFG
PROVA PRÁTICA – OSCE/2018
PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA GERAL

ESTAÇÃO E – UROLOGIA – CHECKLIST

Postura com o paciente: (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; apenas um = 0,5 ponto; os dois = 1,0 ponto*).

- Apresentou-se. Cumprimentou.

Analisou os exames e expôs com clareza ao paciente seus resultados o fato de ter sido diagnosticado Câncer: (*Pontuação: não = 0,0 ponto; sim = 1,0 ponto*).

- Sim. Não.

Esclareceu o fato de se realizar biopsia mesmo com toque retal normal: (*Pontuação: não = 0,0 ponto; sim = 1,0 ponto*).

- Sim. Não.

Ao ser questionado sobre a necessidade de se fazer biopsia com níveis de PSA baixos (normais) e o toque com nódulo prostático isolado respondeu da forma correta: (*Pontuação: não = 0,0 ponto; sim = 1,0 ponto*).

- Sim. Não.

Solicitou exames complementares: (*Pontuação: nenhum item = 0,0; 1 item = 0,5; 2 ou mais itens = 1,0 ponto*).

- Cintilografia óssea.
 Tomografia computadorizada pélvica.
 Ressonância magnética pélvica.

Indicou com clareza as opções de tratamento para a doença: (*Pontuação: nenhum item = 0,0; 1 item = 0,5; 2 ou mais itens = 1,0 ponto*).

- Cirurgia. Radioterapia. Vigilância ativa.

Descreveu com clareza as opções possíveis de cirurgia: (*Pontuação: nenhum item = 0,0; 1 item = 0,5; 2 ou mais itens = 1,0 ponto*).

- Laparoscópica. Robótica. Perineal. Cirurgia aberta (convencional).

Complicações relacionadas ao tratamento cirúrgico: (*Pontuação: nenhum item = 0,0; 1 item = 0,5; 2 ou mais itens = 1,0 ponto*).

- Hemorragia. Incontinência urinária. Disfunção erétil. Estenose uretral.

Detalhou ao paciente as possibilidades de tratamento para uma eventual disfunção erétil pós-operatória: (*Pontuação: nenhum item = 0,0; 1 item = 0,5; 2 ou mais itens = 1,0 ponto*).

- Medicação oral. Injeção intravenosa. Prótese peniana.

Nível de PSA considerado recidiva após a cirurgia: Acima de 0,2. (*Pontuação: citou outro nível = 0,0; acima de 0,2 = 1,0 ponto*).