

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DA UFG - 2019**

**RESPOSTAS ESPERADAS
INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO**

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas preliminares da prova Teórico-Prática com abordagem discursiva. Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de correção. Serão também consideradas corretas outras respostas que se encaixarem no conjunto de ideias que correspondem às expectativas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento no que se refere à competência e/ou habilidades na utilização de conceitos e/ou técnicas específicas. Respostas parciais também serão aceitas, contudo, a pontuação a elas atribuída considerará os diferentes níveis de acerto, quando for o caso.

Questão 01

Para uma adequada antisepsia cirúrgica das mãos são necessários lavabo cirúrgico, torneira com acionamento no pé, cotovelo ou joelho; dispensador de sabão líquido e antisséptico; escovas individuais macias e compressas, ambas estéreis. É recomendado que os lavabos sejam exclusivos para a antisepsia cirúrgica, com profundidade suficiente para permitir a lavagem dos antebraços, sem que o mesmo toque no equipamento. É recomendado que antes do início de quaisquer formas de higienização das mãos, como na técnica de antisepsia cirúrgica, os profissionais retirem os adornos. O consenso é que o tempo seja de três a cinco minutos antes da primeira cirurgia do dia, e de dois a três para as subsequentes. A técnica para realizar a antisepsia cirúrgica das mãos consta dos seguintes passos: friccionar todas as superfícies das mãos e os antebraços durante o tempo recomendado pelo fabricante, enxaguar as mãos e antebraços em água corrente em uma única direção, das pontas dos dedos para o cotovelo, secar as mãos e antebraços com uma compressa estéril e técnica asséptica, antes de vestir avental e calçar luvas. caso as mãos estiverem visivelmente sujas, lavá-las com sabonete líquido normal antes do preparo cirúrgico das mãos.

(10 pontos)

Questão 02

A técnica de laparoscopia inclui:

1. Incisão transversal supraumbelical de cerca de 1,5 cm
2. Introdução de agulha de Veress para realização de pneumoperitoneo com CO₂. Para a realização do pneumoperitoneo é utilizado um insuflador a pressão.
3. Após distensão abdominal satisfatória, retirada da agulha de Veress e introdução de trocar de 10mm de diâmetro
4. A seguir, colocação da ótica de 0°. Para iluminação é empregada uma fonte de luz.
5. Há em seguida a conexão da microcâmera à ótica que permitirá a visualização por meio de um monitor, ampliando e mostrando imagens mais detalhadas.

(10 pontos)