

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E TRABALHO PARA O SUS
ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA “CÂNDIDO SANTIAGO”
GRUPO TÉCNICO DO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL DA SES-GO
EDITAL Nº 41/2018 SEST-SUS/SES-GO

RESIDÊNCIA MÉDICA – 2019
GABARITO FINAL
ACESSO DIRETO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
D	A	C	D	B	A	X	D	A	C	C	B	D	B	C	C	D	A	D	D	B	A	X	C	D	A
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
B	D	D	A	C	B	D	C	D	C	A	D	X	D	B	D	C	D	B	A	C	A	C	A	B	A
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
C	D	D	A	D	C	C	X	C	B	B	B	D	B	D	D	A	C	B	C	D	D	B	A	D	C
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100				
D	D	A	A	C	B	D	D	C	C	D	X	D	A	B	B	C	X	D	C	B	B				

Questão 07: Anulada – pois outras interleucinas estão associadas a outros cromossomos que não o segundo, com isso gerou dúvida na interpretação da questão.

Questão 23: Anulada – houve erro formal na questão.

Questão 39: Anulada – pois há dados divergentes na literatura e, ainda que os dados do ministério saúde apontem para o fato das mulheres no Brasil tentarem mais suicídio que os homens, a questão não faz menção a dados especificamente brasileiros.



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



ESTADO
DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E TRABALHO PARA O SUS
ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA “CÂNDIDO SANTIAGO”
GRUPO TÉCNICO DO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL DA SES-GO
EDITAL Nº 41/2018 SEST-SUS/SES-GO

Questão 60: Anulada – pois, apesar de todas as demais alternativas estarem incorretas, dentre os betalactâmicos, a penicilina e a ampicilina são drogas prioritárias para o tratamento de infecções por *Enterococcus spp* sensíveis. Entretanto, pela possibilidade de uso de ambas como drogas de escolha, consideramos que a redação da afirmativa correta pode ser considerada incompleta.

Questão 90: Anulada – pois, no documento atualizado pelo Ministério da Saúde, existe a indicação da OMS, em 30 de agosto de 2016, que o perímetro cefálico deve ser medido entre 24 e 48 horas de vida da criança. Portanto, não há alternativa com esta opção.

Questão 96: Anulada – houve erro na elaboração da questão, pois tanto a alternativa B, quanto a alternativa C podem ser consideradas corretas.

Goiânia, 04 de dezembro de 2018.