

ESTAÇÃO A - GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Postura com a paciente: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item = 0,5 ponto; 2 itens = 1,0 ponto).

- Cumprimentou. Fez contato visual.

Postura com a paciente: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item = 1,0 ponto):

- Se apresentou

Hipótese diagnóstica: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; citou neoplasia/tumor de ovário = 0,5 ponto; citou câncer/carcinoma de ovário maligno = 1,0 ponto).

- Neoplasia/tumor de ovário (sem especificar se maligno ou não). Cânc/carcinoma de ovário (especificar maligno).

Diagnósticos diferenciais: (Pontuação: nenhum ou 1 item = 0,0 ponto; 2 itens = 0,5 ponto; 3 ou mais itens = 1,0 ponto).

- Massas benignas das regiões anexiais. Cistos funcionais. Cistos hemorrágicos.
 Cistos de inclusão peritoneal. Gravidez ectópica. Miomas subserosos.
 Abscesso pélvico. Endometriose/endometrioma. Rim pélvico.
 Tumores intestinais. Tumores retroperitoneais.
 Neoplasias benignas dos ovários (epiteliais, células germinativas, de cordões sexuais ou do estroma).

Exames complementares: (Pontuação: nenhum ou 1 item = 0,0 ponto; 2 a 4 itens = 0,5 ponto; 5 ou mais itens = 1,0 ponto).

- Marcadores tumorais. CA-125. Raio X de tórax.
 Antígeno carcinoembrionário (CEA). TGO. TGP.
 RNM ou TC. Gama GT. Colonoscopia.
 Ultrassonografia de abdome. Endoscopia digestiva alta. Bilirrubinas.

Fatores predisponentes: (Pontuação: nenhum ou 1 item = 0,0 ponto; 2 a 4 itens = 0,5 ponto; 5 ou mais itens = 1,0 ponto).

- Idade avançada. Obesidade. Mama densa. Antecedente familiar/síndrome de Lynch II.
 Terapia estrogênica isolada/estrogênica. Menarca precoce. Baixa paridade. Menopausa tardia.
 Baixos níveis de alfa L-fucosidade. Drogas indutoras de ovulação. Infertilidade.
 Ingesta excessiva de gordura animal. População judaica Ashkenazi. Mutações genéticas.

Fatores de proteção: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 a 2 itens = 0,5 ponto; 3 ou mais itens = 1,0 ponto).

- Multiparidade. Contracepção hormonal. Menarca tardia. Gravidez em idade precoce
 Amamentação por mais de dois anos. Terapia hormonal combinada. Menopausa precoce.

Como deve ser feito o diagnóstico: (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; citou anatomopatológico OU laparotomia exploratória = 0,5 ponto; citou laparotomia exploratória E anatomopatológico = 1,0 ponto*).

Laparotomia exploradora.

Anatomopatológico do material retirado na cirurgia.

Recursos terapêuticos: (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; citou cirurgia OU quimioterapia = 0,5 ponto; citou cirurgia E quimioterapia = 1,0 ponto*).

Cirurgia.

Quimioterapia.

Tipo histológico: (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; tumor/carcinoma epitelial/seroso = 1,0 ponto*).

Tumor maligno/carcinoma epitelial/seroso.