

## ESTAÇÃO C - CLÍNICA MÉDICA

**Questionou sobre as características do sangramento:** (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item = 0,5 ponto; 2 a 4 = 1,0 ponto*).

- Quantidade.       Aspecto.       Odor.       Duração.

**Questionou sobre sintomas concomitantes:** (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 ou 2 itens = 0,5 ponto; 3 a 7 itens = 1,0 ponto*).

- Febre.       Dor ou cólica.       Vômitos.       Náuseas.  
 Dispepsia.       Emagrecimento.       Palpitações.

**Questionou sobre os fatores de risco:** (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 ou 2 itens = 0,5 ponto; 3 a 7 itens = 1,0 ponto*).

- Sangramento prévio.       Câncer.       Doença hepática.       História de *H. pylori*.  
 História de úlcera péptica.       Doença renal.       Uso de álcool.

**Questionou sobre o uso prévio de medicamentos:** (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item = 0,5 ponto; 2 a 3 itens = 1,0 ponto*).

- Anti-inflamatório não esteroide.       Antiagregante plaquetário. \_\_\_\_\_  
 Anticoagulante. \_\_\_\_\_

**Citou os dados do exame médico:** (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 ou 2 itens = 0,5 ponto; 3 a 10 itens = 1,0 ponto*).

- Pressão arterial.       Pressão arterial deitado em pé.       Pulso.       Nível de consciência.  
 Oximetria de pulso/SatO<sub>2</sub>       Mucosas descoradas/palidez.       Sudorese fria.       Enchimento capilar.  
 Frequência cardíaca.       Perfusão periférica diminuída.

**Citou a realização do toque retal:** (*Pontuação: não = 0,0 ponto; sim = 1,0 ponto*).

- Sim.       Não.

**Definiu as condutas iniciais:** (*Pontuação: nenhum ou 1 item = 0,0 ponto; 2 ou 3 itens = 0,5 ponto; 4 a 9 itens = 1,0 ponto*).

- Monitorização cardíaca.       Oxigênio suplementar.       Ranitidina ou qualquer bloqueador H<sub>2</sub>.  
 Transfusão de sangue.       Infusão de solução cristalóide (Ringer lactato)       Papa de hemácias.  
 Acesso venoso periférico calibroso.       Inibidor de bomba de próton. \_\_\_\_\_  
 Reserva de sangue.

**Solicitou exames complementares:** (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item = 0,5 ponto; 2 a 8 itens = 1,0 ponto*).

Hemograma.

HB/HT.

Plaquetas.

TAP.

TTPA.

Ureia.

Creatinina.

Tipagem sanguínea.

**Solicitou endoscopia digestiva alta:** (*Pontuação: não = 0,0 ponto; sim = 1,0 ponto*).

Sim.

Não.

**Principais hipóteses diagnósticas para o sangramento:** (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item = 1,0 ponto*).

Lesão aguda de mucosa gástrica.

Hemorragia digestiva alta.

Hemorragia digestiva alta associado ao uso de anticoagulante/antiplaquetário.

Úlcera péptica associado ao uso de AINE.

Úlcera péptica.