

ESTAÇÃO D - MEDICINA TROPICAL

Postura com o paciente: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; cumprimentou OU se apresentou = 0,5 ponto; cumprimentou E se apresentou = 1,0 ponto).

- Cumprimentou. Se apresentou.

Hipóteses diagnósticas e exames complementares: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 ou 2 itens incluindo obrigatoriamente HIV = 0,5 ponto; 3 ou mais itens incluindo obrigatoriamente HIV = 1,0 ponto).

- HIV. Hepatite B. Hepatite C. Doença de Chagas.
 Exames de toxicidade: _____

Resultados dos exames e conduta adequada: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; explicou OU orientou a medicação = 0,5 ponto; explicou E orientou a medicação = 1,0 ponto).

- Explicou que os exames negativos somente indicam que não tinha a doença no momento do acidente.
 Orientou a necessidade da medicação do HIV para a prevenção.

Quimioprofilaxia para HIV (PEP – esquema antirretroviral): (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; Apenas coquetel OU antirretroviral OU remédios para HIV = 0,5 ponto; medicação correta = 1,0 ponto).

- Citar apenas coquetel OU antirretroviral OU mesmos remédios para HIV.
 Citar a medicação correta: Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir com ou sem posologia.

Prevenção da Hepatite B: (Pontuação: nenhum ou orientou a vacinação para hepatite B = 0,0 ponto; orientou sobre outras vacinas exceto hepatite B = 0,5 ponto; orientou que já está imunizado para hepatite B e/ou não precisa desta vacina novamente e orientou sobre outras vacinas (Tétano, hepatite A, Varicela e Sarampo) = 1,0 ponto).

- Orientar a vacinação ou imunoglobulina, mesmo com AntiHBs > 10.
 Orientar que já está imunizado para Hepatite B e/ou não precisa desta vacina novamente.
 Citou apenas outras vacinas _____

Tempo máximo para o uso da PEP: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; citou apenas duas horas = 0,5 ponto; o mais rápido possível, mas até 72 horas = 1,0 ponto).

- Apenas duas horas.
 O ideal é o mais rápido possível, preferencialmente duas horas, mas citar até 72 horas pode ser indicado.

Tempo de uso correto da medicação para a prevenção do HIV: (Pontuação: nenhum ou diferente de 28 dias ou 4 semanas = 0,0 ponto; Apenas por 28 dias = 1,0 ponto).

- Não especificar o tempo OU dizer diferente de 28 dias.
 28 dias OU 4 semanas.

Interação medicamentosa com a PEP para a tomada de decisão: (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 a 2 itens = 0,5 ponto; 3 ou mais itens = 1,0 ponto*).

- Metformina (diabetes). Fenobarbital. Medicamentos contendo Ca, Fe, Mg
 Rifampicina (tuberculose). Carbamazepina/Oxcarbazepina. Fenitoína. Anticonvulsivante.

Orientar sobre o seguimento: (*Pontuação: nenhum seguimento ou seguimento sorológico hepatite C e HIV com tempo incorreto = 0,0 ponto; orientar somente um seguimento para hepatite C ou HIV com o tempo correto = 0,5 ponto; seguimento correto para HIV e para Hepatite C = 1,0 ponto*).

- Seguimento sorológico para HIV com o tempo incorreto. _____
 Seguimento sorológico para Hepatite C com o tempo incorreto. _____
 Seguir HIV por três meses (exceção: HIV por até um ano **SE** soroconversão de HCV).
 Seguir Hepatite C por seis meses.

Uso de preservativo nas relações sexuais: (*Pontuação: não orientou = 0,0 ponto; orientou o uso durante o seguimento = 1,0 ponto*).

- Orientar o uso durante o seguimento.