

ESTAÇÃO E - CLÍNICA CIRÚRGICA

Principais hipóteses diagnósticas: (*Pontuação: nenhum ou 2 itens = 0,0 ponto; 3 itens = 0,5 ponto; 4 ou mais itens = 1,0 ponto*).

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Doença de Chron. | <input type="checkbox"/> Colite indeterminada. | <input type="checkbox"/> Neoplasia. | <input type="checkbox"/> Clostridium diffile. |
| <input type="checkbox"/> Tuberculose intestinal. | <input type="checkbox"/> Paracoccidioide micose – BSA | <input type="checkbox"/> Doença celíaca. | |
| <input type="checkbox"/> Síndrome do intestino irritável. | <input type="checkbox"/> Intolerância a lactose. | <input type="checkbox"/> Retocolite ulcerativa. | |

Diagnóstico definitivo: (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; um item = 1,0 ponto*).

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Doença de Chron. | <input type="checkbox"/> Ileíte. | <input type="checkbox"/> Colite de Chron. |
|---|----------------------------------|---|

Etiopatogenia: (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; um item = 1,0 ponto*).

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Autoimune. | <input type="checkbox"/> Fatores genéticos. |
|-------------------------------------|---|

Tratamento clínico: (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; um item = 1,0 ponto*).

- Clínico.

Tratamento na fase aguda: (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item = 0,5 ponto; 2 ou mais itens incluindo obrigatoriamente corticoide = 1,0 ponto*).

- | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Corticoide. | <input type="checkbox"/> Metronidazol. | <input type="checkbox"/> Ciprofloxacino. | <input type="checkbox"/> Infliximabe. | <input type="checkbox"/> Adalimumabe. |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|

Tempo de resposta com azatioprina: (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; um item = 1,0 ponto*).

- Não existe indicação pois o efeito terapêutico é demorado.

Tratamento de manutenção: (*Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; um item = 0,5 ponto; 2 ou mais = 1,0 ponto*).

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Infliximabe. | <input type="checkbox"/> Adalimumabe |
| <input type="checkbox"/> Certolizumabe. | <input type="checkbox"/> Vedolizumabe. |
| <input type="checkbox"/> Ustequinumabe. | <input type="checkbox"/> Metotrexato. |
| <input type="checkbox"/> Azatioprina. | <input type="checkbox"/> 6 mercaptopurina. |

Indicação de tratamento cirúrgico: (*Pontuação: nenhum ou 2 itens = 0,0 ponto; 3 itens = 0,5 ponto; 4 ou mais itens = 1,0 ponto*).

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Estenose com fibrose. | <input type="checkbox"/> Intratabilidade clínica. |
| <input type="checkbox"/> Perfuração intestinal com peritonite. | <input type="checkbox"/> Reação adversa medicamentosa. |
| <input type="checkbox"/> Malignização. | <input type="checkbox"/> Hemorragia digestiva baixa maciça. |

Fatores de risco para a recorrência pós-operatória: (*Pontuação: nenhum ou 2 itens = 0,0 ponto; 3 itens = 0,5 ponto; 4 ou mais itens = 1,0 ponto*).

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tabagismo. | <input type="checkbox"/> Doença fistulante ou penetrante. | <input type="checkbox"/> Paciente jovem. |
| <input type="checkbox"/> Doença perianal associada. | <input type="checkbox"/> Cirurgia prévia. | <input type="checkbox"/> Enterectomias extensas. |

Marcadores de recidiva pós-operatória: (*Pontuação: nenhum ou 2 itens = 0,0 ponto; 3 itens = 0,5 ponto; 4 ou mais itens = 1,0 ponto*).

Quadro clínico.

Colonoscopia.

Êntero ressonância.

Proteína C reativa – PCR.

Calprotectina fecal.

Êntero tomografia.