

ESTAÇÃO C - Ginecologia/Obstetrícia

1 - Postura com a paciente (Pontuação: nenhum = 0,0 pontos; 1 item = 0,5 ponto; 2 itens = 1,0 ponto)

- ☐ Cumprimentou ☐ Se apresentou

2 - Postura com a paciente (Pontuação: nenhum ou outra forma de tratamento = 0,0 pontos; perguntou pelo nome e a tratou pelo nome ao longo da consulta = 1,0 ponto)

- ☐ Perguntou o nome da paciente e a tratou pelo nome ao longo da consulta
☐ Outra forma de tratamento _____

3 - Posição do feto (Pontuação: nenhum = 0,0 pontos; 1 item = 0,5 ponto; 2 itens = 1,0 ponto)

- ☐ Situação longitudinal ☐ Apresentação cefálica

4 - Tamanho do feto (Pontuação: nenhum ou outro = 0,0 pontos; tamanho normal = 1,0 ponto)

- ☐ Normal, pois a altura uterina está medindo 34 cm
☐ Outro _____

5 - Oxigenação fetal (Pontuação: nenhum ou outro = 0,0 pontos; frequência cardíaca adequada = 1,0 ponto)

- ☐ Adequada, pois a FC encontra-se entre 130 - 150 BPM (ou normal) durante a condução do parto
☐ Outro _____

6 - Condições da pelve (Pontuação: nenhum = 0,0 pontos; 1 itens = 0,5 ponto; 2 ou mais itens = 1,0 ponto)

- ☐ Ângulo subpúbico normal
☐ Espinhas isquiáticas com distância adequada uma da outra
☐ Promontório não atingível/conjugado diagonal normal

7 - Diagnóstico (Pontuação: nenhum ou apenas distócia = 0,0 pontos; 1 item = 1,0 ponto)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Distócia funcional | <input type="checkbox"/> Contrações uterinas fracas |
| <input type="checkbox"/> Poucas contrações uterinas | <input type="checkbox"/> Contrações uterinas ineficazes |
| <input type="checkbox"/> Contrações uterinas desorganizadas | <input type="checkbox"/> Ausência de contrações |
| <input type="checkbox"/> Fase ativa prolongada | |

8 - Parâmetros para a conclusão do diagnóstico (Pontuação: nenhum = 0,0 pontos; 1 item = 0,5 ponto; 2 itens = 1,0 ponto)

- ☐ Linha de alerta foi ultrapassada ☐ Dilatação < que 1 cm a cada hora

9 - Conduta para o momento (Pontuação: nenhum = 0,0 pontos; somente deambulação = 0,5 ponto; ocitocina ou promover a melhora das contrações = 1,0 ponto)

- ☐ Promover a melhora das contrações ☐ Ocitocina ☐ Deambulação

10 - Via de parto recomendada e justificativa (Pontuação: nenhum risco ou nenhum outro tipo de parto = 0,0 pontos; somente o parto vaginal e/ou 1 complicação = 0,5 ponto; parto transvaginal e 2 ou mais complicações = 1,0 ponto)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Parto transvaginal/normal | <input type="checkbox"/> Diminui o risco de hemorragia |
| <input type="checkbox"/> Diminui o risco de infecções | <input type="checkbox"/> Diminui o risco anestésico |
| <input type="checkbox"/> Diminui complicações em partos futuros | |
| <input type="checkbox"/> Outro _____ | |