

Especialista em Saúde  
**MÉDICO**  
**OFTALMOLOGISTA**

**26/06/2022**

PROVAS	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 05
História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiânia e do Estado de Goiás	06 a 10
Conhecimentos Gerais em Saúde Pública	11 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 50

**SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO**

**ATENÇÃO:** Transcreva no espaço designado da sua  
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras  
maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

**Roupa limpa no varal.**

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.
2. Este caderno é composto de questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas **uma** é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta de tinta **AZUL** ou **PRETA**, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação, terá pontuação zero.

Leia o texto a seguir para responder às questões de **01 a 05**.

### Nomes brandos para o fim do mundo

[...] As palavras não são rótulos postos sobre coisas que já existem, mas sim expressões da nossa forma de ver o mundo. Essa correlação ficou conhecida como hipótese de Sapir e Whorf. Ao estudarem as línguas indígenas da América do Norte, Edward Sapir (1884-1939) e Benjamin Lee Whorf (1897-1941) chegaram à conclusão de que a língua não é “um instrumento de comunicação”, [...] mas sim um fator decisivo na formação da visão do mundo.

### A invenção da “mudança climática” e do “aquecimento global”

Está em cartaz no Sesc Pompeia a exuberante exposição *Amazônia*. Com curadoria de Lélia Wanick Salgado, a exposição conta com fotos monumentais de Sebastião Salgado e com belos recursos audiovisuais. Entre eles, há vídeos com depoimentos de lideranças indígenas das regiões fotografadas, relatando dificuldades que lhes vêm sendo impostas pela ação dos não indígenas – inclusive na forma de políticas públicas.

Em um desses depoimentos, Afukaká Kuikuro, cacique do povo kuikuro, denuncia como agressões do “homem branco” à natureza têm gerado prejuízos imensuráveis à sobrevivência na/da floresta. A certa altura, falando dos efeitos danosos da ação humana, ele pondera: “o homem branco chama isso de ‘mudança climática’”.

É um rico exercício de alteridade tentarmos analisar essa expressão linguística sob a ótica indígena. O termo “mudança climática” chama atenção do cacique, ao que tudo indica, por soar conveniente, quase hipócrita. Sem fazer menção explícita ao ato de devastar e destruir o meio ambiente, adotamos regularmente um substantivo que expressa um processo, o que acaba por criar a impressão de que se trata de algo em curso natural, espontâneo.

Mesmo o termo “aquecimento global” pode ser visto nesse viés. Ainda que “mudança” e “aquecimento” possam ser (e no caso são) processos induzidos, o responsável por essa indução desaparece em ambas as expressões. Nessa ótica, não deixa de parecer desfaçatez do nosso mundo dizer aos indígenas que está havendo uma “mudança climática” ou um “aquecimento global”, quando o que temos é a destruição do meio ambiente.

### Pode chamar de “Antropoceno”

O conhecimento científico de geólogos, arqueólogos, geoquímicos, oceanógrafos e paleontólogos já permite afirmar que entramos em uma nova era geológica, a qual vem sendo chamada de “Antropoceno”. O termo, ao incorporar o radical grego “antropo-” (“homem”), explicita os impactos da ação humana na crise climática atual, deixando claro o papel que temos – uns menos, outros bem mais – nesse atual estado de coisas. Segundo artigo de José Eustáquio Diniz Alves:

“O Antropoceno representa um novo período da história do Planeta, em que o ser humano se tornou a força impulsora da degradação ambiental e o vetor de ações que são catalisadoras de uma provável catástrofe ecológica”.

Com algum otimismo, porém, se o termo “Antropoceno”

aponta explicitamente a responsabilidade humana em uma “provável catástrofe ecológica”, ele também pode nos mostrar a possibilidade de intervirmos nesse rumo. Ou, recorrendo mais uma vez à sabedoria de povos originários, podemos investir em “ideias para adiar o fim do mundo” – título do brilhante ensaio de Ailton Krenak, liderança indígena que precisa ser cada vez mais ouvida.

BRAGA, Henrique; MÓDULO, Marcelo. Nomes brandos para o fim do mundo. *Jornal da USP*. 1º abr. 2022. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/artigos/nomes-brandos-para-o-fim-do-mundo/>>. Acesso em: 5 abr. 2022. (Adaptado).

### — QUESTÃO 01 —

O núcleo temático que permeia todo o texto gira em torno da consideração de que

- (A) as culturas indígenas existentes no Brasil compartilham com as culturas não indígenas termos e expressões relativas a catástrofes globais.
- (B) o inventário lexical de uma língua existe em função da representação objetiva do mundo.
- (C) o ser humano é o responsável direto pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento global e pelo apagamento de línguas indígenas.
- (D) as palavras constituem expressão das concepções que determinado povo tem em relação ao mundo.

### — QUESTÃO 02 —

Em um dos subtítulos presentes no texto, os autores chamam mudança climática e aquecimento global de “invenção”. O uso da palavra “invenção”, nesse contexto, reporta

- (A) à criatividade humana de nomear com precisão processos naturais de dimensão universal.
- (B) à visão indígena sobre expressões linguísticas criadas pelos homens brancos para se eximirem de responsabilidades.
- (C) à habilidade irônica dos autores do texto para dissociarem numa só palavra aquilo que dizem daquilo que pensam de fato.
- (D) à crença de alguns de que os processos de mudança climática e do aquecimento global inexistem de fato.

### — QUESTÃO 03 —

Conforme o texto, fazer uso da palavra *antropoceno* para designar a nova era geológica tem como consequência:

- (A) a explicitação do protagonismo do ser humano nos rumos da ecologia global.
- (B) a proposição de novas ideias para adiar o fim do mundo, tal como defende importante liderança indígena.
- (C) o avanço nas discussões sobre uma iminente catástrofe ecológica num futuro próximo.
- (D) o alinhamento de diferentes perspectivas teórico-científicas sobre a participação da tecnologia nessa nova era geológica.

**— QUESTÃO 04 —**

O trecho “Ainda que ‘mudança’ e ‘aquecimento’ possam ser (e no caso são) processos induzidos, o responsável por essa indução desaparece em ambas as expressões” mantém o seu valor argumentativo de oposição em:

- (A) Os termos “mudança” e “aquecimento” revelam processos induzidos, logo, há a necessidade de manifestar o agente dessa indução.
- (B) Se os conceitos de “mudança” e “aquecimento” são processos induzidos, obviamente, o responsável pela indução pode ser inferido.
- (C) As palavras “mudança” e “aquecimento” remetem a processos induzidos, uma vez que há um responsável por essa indução.
- (D) As noções de “mudança” e “aquecimento” constituem processos induzidos, todavia, o agente da indução é demovido nas duas expressões.

**— RASCUNHO —****— QUESTÃO 05 —**

O “exercício de alteridade” ao qual o texto se refere diz respeito à

- (A) atitude de respeito ao interlocutor, mesmo quando ele enuncia discurso que soa conveniente e hipócrita.
- (B) necessidade de se fazer uso de palavras de origem indígena na prática do português contemporâneo.
- (C) verificação detalhada de uma expressão linguística sob o olhar de uma outra cultura.
- (D) consideração de que as palavras mudam processual e espontaneamente os seus significados.

**— RASCUNHO —**

**— QUESTÃO 06 —**

A distância que separava o Rio de Janeiro, então sede da Corte Imperial, das diversas províncias do Império dificultava para o governo imperial a centralização do poder. Um dos meios utilizados pelo governo para solucionar esse problema em relação a Goiás foi

- (A) estabelecer a autonomia administrativa da província goiana.
- (B) instituir um conselho de estado para atuar na região goiana.
- (C) realizar a nomeação de presidentes sem vínculos com a terra goiana.
- (D) promover o isolamento político das oligarquias locais na província goiana.

**— QUESTÃO 07 —**

Um dos fatores principais para o crescimento e a dinamização do comércio em Goiás, no início do século XX, que veio facilitar a exportação e importação de produtos, foi a

- (A) melhoria das estradas salineiras.
- (B) construção das primeiras rodovias.
- (C) expansão do comércio fluvial.
- (D) chegada da estrada de ferro.

**— QUESTÃO 08 —**

Mantendo uma tradição dos tempos coloniais, durante as festas do Divino Espírito Santo de Pirenópolis e Cidade de Goiás é produzida uma iguaria doce, feita de açúcar e polvilho, em cuja massa molda-se uma medalha denominada “verônica”, tendo ao centro, em relevo, uma pomba, emblema do Espírito Santo. Esta iguaria pertencente à tradição cultural goiana é o

- (A) confeito.
- (B) alfenim.
- (C) sequilho.
- (D) bentinho.

**— QUESTÃO 09 —**

O território goiano foi muito maior que seu tamanho atual. Ao longo do tempo, ele perdeu regiões para o Pará, Maranhão, Mato Grosso e Minas Gerais, como aconteceu em 1816 quando

- (A) a cidade de Carolina foi anexada à capitania do Maranhão.
- (B) a cidade de Santana do Paranaíba passou a pertencer à capitania do Mato Grosso.
- (C) a região do Triângulo Mineiro foi anexada à capitania de Minas Gerais.
- (D) a vila de São João das Duas Barras passou a integrar a capitania do Pará.

**— QUESTÃO 10 —**

Observe a imagem a seguir.



Disponível em: <<https://encyclopedia.itaucultural.org.br/obra62103/nossa-senhora-do-bom-parto>>. Acesso em: 20 mar. 2022.

A imagem de Nossa Senhora do Bom Parto, retratada na figura, é obra de um escultor e dourador goiano do século XIX cognominado, pela excelência de seu trabalho, o “Aleijadinho Goiano”. Trata-se de qual artista?

- (A) José Joaquim da Veiga Valle.
- (B) André Antônio da Conceição.
- (C) Cândido de Cássia e Oliveira.
- (D) Henrique da Veiga Jardim.

**— RASCUNHO —**

**— QUESTÃO 11 —**

Em meio a uma crise econômica, em que as ações governamentais visavam tirar o país da hiperinflação e fomentar o crescimento econômico, teve início, em 1985, o processo de redemocratização do Brasil. Nesse contexto, buscou-se fortalecer o setor público de saúde, expandir a cobertura de assistência a todos os cidadãos, e integrar a medicina previdenciária à saúde pública. Constituiu-se, assim, um sistema único e a sociedade brasileira se mobilizou em torno de um movimento que teve como marco a

- (A) realização da oitava Conferência Nacional de Saúde (8<sup>a</sup> CNS).
- (B) criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes).
- (C) instituição do Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento (Piass).
- (D) implantação da Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (Abrasco).

**— QUESTÃO 12 —**

De acordo com a política nacional de atenção básica, os estabelecimentos de saúde que prestam ações e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) são considerados potenciais espaços de educação, inovação e avaliação tecnológica para a rede de atenção à saúde,

- (A) de integração social, de coordenação de atividades de educação permanente e de formação de preceptores.
- (B) de prática de ações de ensino em serviço, de formação de preceptores e de realização de pesquisas.
- (C) de formação de recursos humanos, de realização de pesquisas e de prática de ações de ensino em serviço.
- (D) de coordenação de atividades de educação permanente, de formação de recursos humanos e de integração social.

**— QUESTÃO 13 —**

De acordo com a Portaria MS n. 1559/2008, as ações de regulação do atendimento no SUS estão organizadas em três dimensões de atuação integradas entre si, quais sejam: a regulação

- (A) do atendimento integral, de sistemas de saúde e da participação da comunidade.
- (B) de sistemas de saúde, da atenção à saúde e do acesso à assistência.
- (C) da participação da comunidade, do atendimento integral e da qualidade dos serviços.
- (D) da atenção à saúde, da qualidade dos serviços e do acesso à assistência.

**— QUESTÃO 14 —**

Para garantir o acesso e o atendimento ao usuário em todos os níveis de atenção à saúde, é imprescindível estabelecer um sistema que promova a articulação entre esses níveis. Nesse sentido, a referência e a contrarreferência compreendem, respectivamente:

- (A) o fluxo de encaminhamento do usuário do nível menor para o de maior complexidade e o referenciamento do nível de maior para o de menor complexidade.
- (B) o referenciamento do usuário do nível secundário para o nível terciário e o fluxo de encaminhamento do nível terciário para o nível primário.
- (C) o fluxo de encaminhamento do usuário do nível maior para o de menor complexidade e o referenciamento do nível de menor para o de maior complexidade.
- (D) o referenciamento do usuário do nível secundário para o nível primário e o fluxo de encaminhamento do nível terciário para o nível secundário.

**— QUESTÃO 15 —**

O sistema de vigilância epidemiológica, por sua importância para a análise da situação de saúde e para o planejamento das ações necessárias, precisa manter-se eficiente. Para tanto, seu funcionamento deve ser regularmente aferido e avaliado por meio de medidas quantitativas e qualitativas. Dentre as medidas quantitativas de avaliação desse sistema, tem-se a sensibilidade e a oportunidade, que significam, respectivamente, a capacidade do sistema de

- (A) operacionalizar as ações com baixo custo e a facilidade para alcançar seus objetivos.
- (B) excluir os “não-casos” e a possibilidade de identificar todos os subgrupos da população onde ocorrem os casos.
- (C) adaptar-se a novas situações epidemiológicas e a aceitabilidade dos profissionais ou organizações que utilizarem o sistema.
- (D) detectar casos e a agilidade do fluxo do sistema de informação.

**— QUESTÃO 16 —**

Com o objetivo de prevenir, controlar e mitigar os riscos de transmissão do coronavírus (Covid-19) em ambientes de trabalho, a Portaria MTP/MS n. 14/2022 estabelece o afastamento das atividades laborais presenciais, nos casos confirmados de Covid-19, por um prazo

- (A) de sete dias, podendo esse prazo ser reduzido para cinco dias, desde que o trabalhador afastado esteja sem febre há 12 horas, sem o uso de medicamentos antitérmicos, e com remissão dos sinais e sintomas respiratórios.
- (B) de até catorze dias, podendo se estender por até sete dias, conforme o trabalhador apresente resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão ou ainda esteja apresentando sinais e sintomas da doença.
- (C) de dez dias, podendo esse prazo ser reduzido para sete dias, desde que o trabalhador afastado esteja sem febre há 24 horas, sem o uso de medicamentos antitérmicos, e com remissão dos sinais e sintomas respiratórios.
- (D) de até 15 dias, podendo se estender por até cinco dias, conforme o trabalhador apresente resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão ou ainda esteja apresentando sinais e sintomas da doença.

**— QUESTÃO 17 —**

A política nacional de humanização (PNH) busca qualificar o modo de atenção e gestão na rede do SUS, incluindo trabalhadores, usuários e gestores, e se estrutura em princípios, método, diretrizes e dispositivos. São princípios da PNH:

- (A) construção da memória do SUS; matriciamento das ações de saúde; escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde.
- (B) transversalidade; indissociabilidade entre atenção e gestão; protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos.
- (C) fomento de grupalidades, coletivos e redes; clínica ampliada; cogestão.
- (D) acolhimento e classificação de risco; defesa dos direitos do usuário; valorização do trabalho e do trabalhador.

**— QUESTÃO 18 —**

A multiprofissionalidade nas ações de saúde é uma modalidade de trabalho coletivo que

- (A) é construída por meio das relações de reciprocidade entre os profissionais de saúde e suas intervenções técnicas das mais diferentes áreas do saber.
- (B) prioriza a verticalização e a compartmentalização dos processos de trabalho.
- (C) transcende o saber individual de cada profissional, permitindo que um ajude em lugar do outro.
- (D) é caracterizada pela sobreposição das ações dos profissionais da equipe de trabalho em busca de soluções para os problemas de saúde identificados.

**— QUESTÃO 19 —**

A integração ensino-serviço é entendida como um processo complexo de trabalho coletivo, acordado, articulado e integrado entre as instituições de ensino e de saúde que apresenta as seguintes finalidades:

- (A) reconhecer os equipamentos de saúde como espaços de ensino; qualificar a atenção à saúde individual e coletiva; e incentivar a participação da comunidade nos espaços de formação em saúde.
- (B) otimizar a formação de preceptores; incentivar a participação da comunidade nos espaços de formação em saúde; e reconhecer os equipamentos de saúde como espaços de ensino.
- (C) qualificar a atenção à saúde individual e coletiva; promover a excelência da formação profissional; e estimular o desenvolvimento e a satisfação dos profissionais dos serviços.
- (D) estimular o desenvolvimento e a satisfação dos profissionais dos serviços; otimizar a formação de preceptores; e promover a excelência da formação profissional.

**— QUESTÃO 20 —**

T.V.D., de 29 anos, encontra-se na 10ª semana gestacional e procura a sala de vacinas da Unidade de Saúde para receber a vacina contra hepatite B. Nesse caso, de acordo com o histórico vacinal da gestante, é recomendada a aplicação da vacina HB recombinante, como se segue:

- (A) administrar 2 doses da vacina, uma na 24ª e a outra na 32ª semana de gravidez.
- (B) iniciar o esquema vacinal ou completar 3 doses com a administração da 2ª dose, 1 mês após a 1ª dose, e, a 3ª dose, 6 meses após a 1ª dose.
- (C) aplicar 1 dose da vacina a partir da 20ª semana de gravidez.
- (D) completar o esquema vacinal com 2 doses, com a administração da 2ª dose, 4 meses após a 1ª dose.

**— QUESTÃO 21 —**

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 76 anos, é atendido na unidade de urgência com dor precordial de forte intensidade irradiada para o ombro esquerdo, associada a náuseas, vômitos e sudorese fria. No eletrocardiograma realizado na admissão, havia um supradesnívelamento do segmento ST de 2 mm nas derivações D1, aVL, V5 e V6.

De acordo com essas informações, a medida terapêutica indicada para o paciente é:

- (A) administração de dose de 900 mg de clopidogrel.
- (B) trombólise com alteplase, independentemente do tempo previsto para que o paciente seja admitido no serviço de hemodinâmica.
- (C) injeção intravenosa de heparina de baixo peso molecular.
- (D) controle da dor com a associação de morfina e anti-inflamatórios não esteroides.

**— QUESTÃO 22 —**

No choque hipovolêmico do paciente politraumatizado

- (A) recomenda-se preferir soluções hipotônicas como ringer lactato, se houver traumatismo cranioencefálico grave.
- (B) ocorrem vários mecanismos que contribuem para a coagulopatia como perda de fatores e plaquetas, ativação excessiva da coagulação, fibrinólise, acidose e hipocalcemia.
- (C) recomenda-se manter hemoglobina igual ou maior que 10 mg/dL, independentemente dos antecedentes móbidos do paciente.
- (D) há consenso na recomendação de se manter o paciente hipotérmico, reduzindo as demandas metabólicas e a produção de lactato.

**— QUESTÃO 23 —**

O diagnóstico e o manejo dos distúrbios hidreletrolíticos requer a compreensão da condição metabólica associada, que inclui:

- (A) o estado hiposmolar presente em todos os casos de hipernatremia.
- (B) a frequente ocorrência de hipercalemia relacionada à infusão de insulina para correção de estado hiperosmolar.
- (C) a presença de hipercalemia na doença de Adisson.
- (D) a pseudo-hiponatremia que pode ser encontrada em pacientes com mieloma múltiplo.

**— QUESTÃO 24 —**

As compressões torácicas durante a reanimação cardio-pulmonar devem, idealmente,

- (A) produzir uma depressão do esterno de 4 a 5 cm.
- (B) manter-se em uma frequência de 60 vezes por minuto.
- (C) ser pausadas para verificação do pulso a cada cinco minutos.
- (D) ser interrompidas para o procedimento de intubação orotraqueal.

**— QUESTÃO 25 —**

Diversos mecanismos neuro-hormonais e hemodinâmicos ocorrem com o objetivo de manter a adequada oferta de oxigênio aos tecidos. Qual mecanismo fisiológico resulta em aumento do débito cardíaco?

- (A) Elevação da resistência vascular periférica pela ação de catecolaminas.
- (B) Elevação da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo.
- (C) Redução da produção de renina pelos rins.
- (D) Redução dos níveis circulantes de peptídeos natriuréticos.

**— QUESTÃO 26 —**

Segundo dados do Datasus, de janeiro de 2011 a janeiro de 2021, a insuficiência cardíaca foi a principal causa de internação hospitalar no Brasil. O uso de diuréticos na insuficiência cardíaca descompensada

- (A) é responsável pela maioria dos casos de agudização da função renal nas primeiras 24 horas de internação.
- (B) está contraindicado em pacientes com fração de ejeção preservada.
- (C) deve ser evitado em pacientes com perfil frio e úmido devido ao risco de agravamento do baixo débito cardíaco.
- (D) pode resultar em redução transitória da pressão arterial mediada por prostaglandinas.

**— QUESTÃO 27 —**

A nefrotoxicidade dos contrastes iodados determina cuidados extras na realização de exames de imagem em pacientes cuja taxa de filtração glomerular é reduzida. Nessa situação,

- (A) administrar bicarbonato de sódio na dose de 5 mL por kg de massa corpórea imediatamente após a infusão do contraste iodado reduz a piora da função renal.
- (B) infundir solução hipotônica, após a injeção do contraste iodado, reduz o risco de complicações em pacientes dialíticos que tenham diurese residual.
- (C) agendar a sessão de hemodiálise para as primeiras 12 horas após a realização do exame tem benefício comprovado em pacientes dialíticos.
- (D) administrar soro fisiológico a 0,9% antes da injeção do meio de contraste mostrou benefício para pacientes com TGF entre 30 e 45 mL/min.

**— QUESTÃO 28 —**

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 38 anos, foi submetida a cirurgia de joelho esquerdo há dez dias e vem apresentando dificuldade de deambulação, edema assimétrico e dor em perna direita. Foi diagnosticada com síndrome do anticorpo antifosfolípide há um ano, mas permanece sem tratamento.

Nesse caso, há indicação do uso de

- (A) rivaroxabana por seis meses.
- (B) varfarina por tempo indeterminado.
- (C) clopidogrel associado a varfarina por longo prazo para profilaxia de eventos arteriais e venosos.
- (D) varfarina por 30 dias.

**— QUESTÃO 29 —**

Ao se analisar a concentração iônica dos principais cristaloides utilizados nas unidades hospitalares, encontra-se

- (A) 5 mEq de sódio em 500 mL de ringer lactato.
- (B) 20 mEq de potássio em 500 mL de soro ringer.
- (C) 50 g de glicose em 500 mL de soro glicosado a 5%.
- (D) 154 mEq de sódio em 1 litro de soro fisiológico a 0,9%.

**— QUESTÃO 30 —**

Em condições normais, é esperado que a relação entre a medida da pressão arterial sistólica no tornozelo e a pressão arterial sistólica do braço ipsilateral seja

- (A) menor que 0,75.
- (B) maior que 0,9.
- (C) entre 0,1 e 0,5.
- (D) menor que 0,5.

**— QUESTÃO 31 —**

Leia o caso clínico a seguir.

Um tenista, durante uma partida, sofre um trauma contuso com a bola de tênis em olho esquerdo (OE). Ao exame oftalmológico, foram observados hiperemia conjuntival e enoftalmia. A tomografia computadorizada demonstrou uma fratura tipo *blow-out*.

Considerando o caso descrito, quais os ossos constituintes da parede orbitária mais comumente acometida nesse tipo de fratura?

- (A) Esfenoide, etmoide e maxilar.
- (B) Frontal, esfenoide e etmoide.
- (C) Lacrimal, maxilar e palatino.
- (D) Maxilar, palatino e zigomático.

**— QUESTÃO 32 —**

Analise a receita apresentada a seguir.

Olho direito (OD): +1,00 DE -2,00 DC x 140°  
Olho esquerdo (OE): +3,00 DE -2,00 DC x 50°  
DE: dioptrias esféricas  
DC: dioptrias cilíndricas

Considerando a receita, qual o tipo de astigmatismo apresentado por esse paciente?

- (A) OD: miópico simples; OE: hipermetrópico simples.
- (B) OD: hipermetrópico simples; OE: misto.
- (C) OD: misto; OE: hipermetrópico composto.
- (D) OD: miópico simples; OE: miópico composto.

**— QUESTÃO 33 —**

Leia o caso clínico a seguir.

Criança do sexo masculino, de 10 anos, com quadro de sinusite, evolui com mal-estar, febre e queda da acuidade visual em olho direito. Ao exame oftalmológico, apresenta edema periorbitário, quente e vermelho, oftalmoplegia dolorosa e proptose. A tomografia computadorizada revela opacificação posterior ao septo orbitário à direita.

Nesse caso, qual a conduta?

- (A) Internação hospitalar, antibioticoterapia endovenosa de amplo espectro.
- (B) Antibioticoterapia via oral com cobertura para bactérias Gram - e anaeróbias, com reavaliação em 24 horas.
- (C) Internação hospitalar, punção liquórica e antibioticoterapia endovenosa de amplo espectro.
- (D) Antibioticoterapia via oral com cobertura para bactérias Gram +, Gram - e anaeróbias, punção liquórica, com reavaliação em 24 horas.

**— QUESTÃO 34 —**

São sinais da síndrome de blefarofimose:

- (A) ptose bilateral, pregas epicânticas e epicanto.
- (B) ptose bilateral, entrópio e coloboma da pálpebra superior.
- (C) epicanto inverso, telecanto e pregas epicânticas.
- (D) ptose bilateral, telecanto e epicanto inverso.

**— QUESTÃO 35 —**

Paciente do sexo masculino, de 65 anos, com quadro de dacriocistite crônica. O tratamento indicado foi a dacriocistorrinostomia convencional (externa), que consiste na confecção de uma anastomose entre a cavidade nasal e

- (A) a glândula lacrimal.
- (B) o saco lacrimal.
- (C) o ducto nasolacrimal.
- (D) o canalículo comum.

**— QUESTÃO 36 —**

O principal agente etiológico da conjuntivite bacteriana neonatal é o seguinte:

- (A) *Chlamydia trachomatis*.
- (B) *Staphylococcus aureus*.
- (C) *Neisseria gonorrhoeae*.
- (D) *Escherichia coli*.

**— QUESTÃO 37 —**

Segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº 3.407/1998, são urgências em transplante de córnea:

- (A) risco iminente de perfuração corneana (descemetocele), úlcera fúngica em pacientes imunocomprometidos e opacidade corneana bilateral em portadores de distrofias da córnea.
- (B) risco iminente de perfuração corneana (descemetocele), úlcera fúngica em pacientes imunocomprometidos e opacidade corneana bilateral em receptores com idade inferior a sete anos.
- (C) perfuração corneana já estabelecida, falência secundária do enxerto de córnea 21 dias após o transplante e opacidade corneana bilateral em receptores com idade inferior a sete anos.
- (D) risco iminente de perfuração corneana (descemetocele), úlcera de córnea não responsiva ao tratamento e opacidade corneana bilateral em receptores com idade inferior a sete anos.

**— QUESTÃO 38 —**

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 58 anos, do sexo masculino, diabético, queixa-se de vermelhidão, dor e lacrimejamento em olho esquerdo há cinco dias. Apresenta-se, ao exame, com redução da sensibilidade corneana, injeção ciliar e úlcera com múltiplos dendritos e bulbos terminais.

Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é:

- (A) ceratite fúngica.
- (B) ceratite por herpes simples.
- (C) ceratite por *Pseudomonas aeruginosa*.
- (D) ceratite por herpes-zóster.

**— QUESTÃO 39 —**

Paciente com 15 dias de vida é encaminhado ao oftalmologista por alteração no teste do olhinho (reflexo vermelho). Ao exame, evidenciou-se catarata congênita bilateral grave,

- (A) cujas causas mais comuns são: genética hereditária (autossômica dominante), infecções congênitas, erros inatos do metabolismo.
- (B) cuja morfologia mais comum é polar posterior.
- (C) cuja investigação sistêmica se faz desnecessária.
- (D) cuja terapêutica é o acompanhamento clínico até os dois anos de vida, seguida de realização cirúrgica após essa idade.

**— QUESTÃO 40 —**

Durante a realização de uma cirurgia de catarata, o cirurgião observa aprofundamento da câmara anterior, midríase súbita e dificuldade para aspirar os fragmentos do cristalino. Diante dessa situação, a conduta inicial a ser adotada é a seguinte:

- (A) interromper a aspiração e irrigação, remover a caneta do olho e injetar viscoelástico.
- (B) manter a caneta na câmara anterior do olho, interromper a aspiração e irrigação e injetar viscoelástico pela incisão auxiliar.
- (C) manter a caneta na câmara anterior do olho, interromper a aspiração e irrigação momentaneamente até que os parâmetros sejam ajustados para continuidade da cirurgia.
- (D) interromper a aspiração e irrigação, remover a caneta do olho e ajustar os parâmetros para continuidade da cirurgia.

**— QUESTÃO 41 —**

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 32 anos, queixa-se de baixa súbita da visão em olho direito (OD) há quatro dias, após melhora de quadro viral. Ao exame apresenta acuidade visual em OD de 20/40, ausência de reação de câmara anterior, discreta celularidade vítreo associada a múltiplos pontos brancos de aspecto granular na mácula. A angiografia fluoresceína revela hiperfluorescência precoce em forma de grinalda e o exame de campo visual apresenta um escotoma paracentral.

Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é:

- (A) coroidite puntata interna (PIC).
- (B) coroidite multifocal e pan-uveíte.
- (C) coroidite serpiginosa.
- (D) síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes.

**— QUESTÃO 42 —**

Paciente do sexo masculino, de 35 anos, com quadro de metamorfopsia, micropsia e redução da acuidade visual em olho direito, que melhora ao adicionar +2,00 dioptrias esféricas na refração dinâmica. O exame subsidiário de tomografia de coerência óptica (OCT) em olho direito evidenciará:

- (A) buraco macular menor que 200 micra.
- (B) descolamento seroso macular.
- (C) membrana epirretiniana.
- (D) tração vítreo-macular.

**— QUESTÃO 43 —**

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 65 anos, diagnosticada com diabetes mellitus tipo 2 há 15 anos, apresenta ao exame de fundoscopia em ambos os olhos: microaneurismas e hemorragias em quatro quadrantes associadas a ingurgitamento venoso e alterações microvasculares intrarretinianas (IRMA) em dois quadrantes.

Nesse caso, qual a classificação da retinopatia diabética segundo o ETDRS e a conduta recomendada, respectivamente?

- (A) Retinopatia diabética não proliferativa grave e fotocoagulação a laser.
- (B) Retinopatia diabética não proliferativa grave e vitrectomia posterior via pars plana.
- (C) Retinopatia diabética não proliferativa muito grave e fotocoagulação a laser.
- (D) Retinopatia diabética não proliferativa muito grave e vitrectomia posterior via pars plana.

**— QUESTÃO 44 —**

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 12 anos, queixa-se de queda de visão central progressiva bilateral. Ao exame oftalmológico não há melhora visual com refração e a biomicroscopia de segmento anterior não apresenta alterações. A fundoscopia revela uma mácula de aparência granular com lesões amareladas difusas de diferentes morfologias em ambos os olhos. A angiofluoresceinografia mostra uma hiperfluorescência precoce macular associada a silêncio de coroide.

Nesse caso, qual a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Distrofia macular anular concêntrica benigna.
- (B) Retinosquise congênita.
- (C) Retinose pigmentar.
- (D) Doença de Stargardt.

**— QUESTÃO 45 —**

É um exemplo de patologia que causa glaucoma secundário de ângulo aberto pré-trabecular:

- (A) síndrome Iridocorneoendotelial (ICE).
- (B) síndrome de Sturge-Weber.
- (C) fistula carotidocavernosa.
- (D) síndrome da pseudoexfoliação capsular.

**— QUESTÃO 46 —**

O tratamento indicado para o glaucoma congênito primário é o seguinte:

- (A) iridotomia.
- (B) trabeculectomia.
- (C) trabeculotomia ou goniotomia.
- (D) implante de dispositivo de drenagem.

**— QUESTÃO 47 —**

A tríade clássica do meningioma da bainha do nervo óptico é a seguinte:

- (A) queda da acuidade visual progressiva, edema do nervo óptico e proptose.
- (B) queda da acuidade visual progressiva, atrofia do nervo óptico e shunts optociliares.
- (C) queda da acuidade visual progressiva, astrocitoma e shunts optociliares.
- (D) proptose, edema do nervo óptico e shunts optociliares.

**— QUESTÃO 48 —**

A indicação cirúrgica para uma criança com ptose grave e função do músculo levantador da pálpebra superior muito comprometida (função abaixo de 4 mm) é a seguinte:

- (A) reinserção do tendão do músculo levantador da pálpebra superior.
- (B) ressecção do músculo de Muller.
- (C) suspensão do músculo frontal.
- (D) reinserção do tendão do músculo levantador da pálpebra superior associada à ressecção do músculo de Muller.

**— QUESTÃO 49 —**

Em pacientes que apresentam queimadura química com lesão corneana,

- (A) os álcalis apresentam maior poder de penetração corneana que os ácidos, causando lesões mais graves.
- (B) o grau de isquemia límbica não tem relação direta com o prognóstico da lesão.
- (C) as complicações como simbléfaro, úlceras recorrentes, leucoma e perfuração corneana são muito raras, mesmo nos casos mais graves.
- (D) a irrigação/lavagem ocular com água ou soro fisiológico só deve ser realizada em ambiente hospitalar.

**— QUESTÃO 50 —**

A esotropia infantil, frequentemente,

- (A) é observada ao nascimento.
- (B) apresenta-se associada a problemas neurológicos e síndromes complexas.
- (C) associa-se com desvio vertical dissociado e hiperfunção dos músculos oblíquos, sendo a disfunção dos inferiores mais comum.
- (D) é tratada por meio da correção óptica, que corrige o desvio convergente secundário ao alto erro refrativo.